«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

**НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «ИВЕРМЕКТИН-10» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДО- И ЭКТОПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Ивермектин-10».
1.2 Препарат представляет собой стерильный, прозрачный бесцветный или светло-желтого цвета раствор. В 1 мл препарата содержится 10 мг ивермектина (1%) в специальном органическом растворителе и вспомогательные компоненты (консерванты, антиоксиданты).
1.3 «Ивермектин-10» выпускается в стеклянных флаконах вместимость 10, 20, 50, 100 и 200 мл.
1.4 Препарат хранят с предосторожностью (список Б) в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте вдали от источников тепла и открытого огня при температуре от 0°С до +25°С.
Срок годности 2 года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

## 2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Препарат обладает выраженным противопаразитарным действием на личиночные и половозрелые стадии нематод желудочно-кишечного тракта и легких, личинки подкожных, носоглоточных и желудочных оводов, вшей-кровососок и саркоптоидных клещей.
2.2 Ивермектин усиливает выработку нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов, параличу и гибели паразитов.
2.3 Препарат быстро всасывается из места введения, распределяется в органах и тканях животного, обеспечивая паразитоцидное действие в течение 10-14 дней.
2.4 Ивермектин малотоксичен для теплокровных животных, в рекомендуемых дозах, не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия. Выводится ивермектин из организма с мочой и желчью, у лактирующих животных - также с молоком.

## 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 «Ивермектин-10» назначают животным с лечебной и профилактической целью при арахно-энтомозах и нематодозах:
- крупному рогатому скоту - при стронгилятозах, трихоцефалезе, стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозах, гиподерматозе, псороптозе, саркоптозе и хориоптозе;
- мелкому рогатому скоту (овцам и козам) - при диктиокаулезе, протостронгилезе, мюллериозе, гемонхозе, остертагиозе, нематодирозе, маршаллагиозе, коопериозе, хабертиозе, эзофагостомозе, буностомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, малофагозе, эстрозе, псороптозе и хабертиозе;
- свиньям - при трихоцефалезе, аскаридозе, метастронгилезе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, стефанурозе, гематопинозе и саркоптозе;
- лошадям - при параскаридозе, оксиурозе, стронгилятозах, гастрофилезе и саркоптозе;
- собакам и кошкам - при токсокарозе и токсаскариозе, анкилостомозе и унцинариозе, нотоэдрозе, саркоптозе и демодекозе.
3.2 Препарат вводят животным с соблюдением правил асептики подкожно: свиньям - в область шеи или внутренней поверхности бедра, другим видам животных - в область крупы или шеи в следующих дозах:
***- крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, собакам, кошкам – по 1,0 мл на 50 кг веса животных (0,2 мг ивермектина на 1 кг веса) однократно. В тяжелых случаях заболевания саркоптоидозами обработку проводят двукратно с интервалом 8-10 дней;***
***- свиньям - 1 мл на 33 кг веса животных (0,3 мг ивермектина на 1 кг веса) однократно. В тяжелых случаях заболевания саркоптозом обработку проводят двукратно.***
В случаях, если объем вводимого раствора составляет более 10 мл, его следует вводить животному в несколько мест. Для точного дозирования мелким животным препарат можно разбавить стерильной водой в необходимое количество раз.
3.3 Против нематод препарат применяют животным перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выводом на пастбище, против личинок оводов - сразу после окончания летнего оводов, против возбудителей арахно-энтомозов - по показаниям.
**3.4 Особые указания.** Каждую партию препарата предварительно испытывают на небольшой группе (7-10 голов) животных. При отсутствии осложнений в течение 3 дней приступают к обработке всего поголовья.
**3.5 Противопоказания:** Нельзя применять одновременно с другими антигельминтными средствами. Не обрабатывать истощенных и больных животных, а также беременным самкам менее чем за 28 дней до родов. Не применяют препарат собакам и кошкам за 2 недели до и после родов, собакам пород Колли, Шелти, Бобтейл и щенкам до 6-месячного возраста. Не разрешается применение ивермектина дойным коровам.
**3.6 Побочное действия:** При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату у некоторых животных наблюдается возбуждение, усиление саливации (у собак рвота), учащение дефекации и мочеиспускания, атаксия. Указанные симптомы проходят, как правило, самопроизвольно, без применения терапевтических средств.
3.7 Убой на мясо обработанных препаратом животных разрешается не ранее, чем через 28 дней после обработки. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

## 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными препаратами. Все работы с препаратом следует осуществлять с использованием спецодежды (халат, головной убор, резиновые перчатки). При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть большим количеством воды. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.
4.2 По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки.
4.3 Пустые флаконы из-под препарата замачивают 5%-м раствором гидроокиси натрия на 24 часа.
4.4 Запрещается использование тары из-под препарата для хранения пищевых продуктов.

## 5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
**ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»**
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-42:2016

biveco®
biveco.com