«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
«АМПРОВЕТ ПОРОШОК 25%» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭЙМЕРИОЗОВ ПТИЦ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Ампровет порошок 25%» - химиотерапевтический препарат, действующим веществом которого является ампролиум.
1.2 По внешнему виду препарат представляет собой белый или слегка желтоватый однородный порошок.
1.3 «Ампровет порошок 25%» выпускают расфасованным по 50, 100, 250, 500 или 1000 г в полимерные пакеты или по 250, 500, 1000, 2000 или 3000 г в полимерные емкости.
1.4 Препарат хранят в сухом, темном помещении, недоступном для детей, при температуре от 0°С до +30°С.
Срок годности 3 года.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Механизм действия препарата заключается в том, что в системе метаболических энзимов кокцидий ампролиум конкурирует с тиамином, нарушая метаболизм углеводов, необходимых для жизнедеятельности кокцидий.
2.2 Ампролиум относится к умеренно токсичным препаратам для теплокровных животных, в рекомендуемых дозах не обладает мутагенным, сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным действиями, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу.
2.3 При оральном применении ампролиум практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, проявляя свое антикокцидийное действие на слизистых и подслизистых оболочках. Выводится ампролиум, главным образом, в неизмененном виде - с фекалиями, в течение 3-4 дней.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 «Ампровет порошок 25%» эффективен в отношении различных эймерий: E. maxima, E. acervulina, E. mitis, E. tentla, E. nekatrix, E. brunetti, E. zurnii, E. ninakoljykimovi.
3.2 Для лечения кокцидиозов у кур и индеек «Ампровет порошок 25%» применяют из расчета 100 г препарата на 100 кг сухого корма в течение 3-5-х дней подряд, а затем (с 4-6 дня) в дозе 500 г на 1 тонну корма в течение 14 дней. Препарат тщательно смешивают с кормом, сначала перемешивая с небольшим количеством корма, а затем с остальной его частью.
С водой «Ампровет порошок 25%» применяют из расчета 20 г препарата на 10 литров питьевой воды в течение 5-10 дней.
С профилактической целью цыплятам препарат применяют, начиная с 7-15-дневного возраста, ежедневно в течение 50-60 дней из расчета 50 г препарата на 100 кг сухого корма или 5 г препарата на 10 л питьевой воды.
3.3 При эймериозе крупного рогатого скота «Ампровет порошок 25%» в дозе 2,5-5,5 г на 10 кг живой массы скармливают в смеси с кормами на протяжении 30 дней.
3.4 Овцам при эймериозе препарат применяют в дозе 2 г на10 кг живой массы. Препарат задают с кормом на протяжении 20 дней.
3.5 В рекомендованных дозировках препарат не вызывает побочных эффектов.
3.6 Противопоказания. Не допускается применение ампролиума ремонтному молодняку кур после 16-недельного возраста. Запрещается применять ампролиум курам-несушкам, т.к. препарат выделяется с яйцами. Запрещается использование ампролиума одновременно с другими кокцидиостатиками.
3.7 Убой птицы на мясо разрешается через 5 суток после прекращения использования препарата. Мясо, полученное от вынужденно убитых птиц, до истечения указанного срока, используют для кормления плотоядных животных или для производства мясокостной муки.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы с препаратом следует осуществлять с использованием спецодежды (халат, головной убор, резиновые перчатки). При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть большим количеством воды.
4.2 Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу.
4.3 По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки.
4.4 Запрещается использование тары из-под препарата для хранения пищевых продуктов.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30-47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-47:2013

biveco®
biveco.com