«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 8 апреля 2009 г.
Протокол № 28 от 20.09.2008 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА БРОМОЛОН (ЗЕРНОВАЯ ПРИМАНКА)
ДЛЯ БОРЬБЫ С СИНАНТРОПНЫМИ ГРЫЗУНАМИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Бромолон» (bromolonum)

1.2 Готовая к применению приманка на основе зерна, содержащая в качестве активнодействующего вещества 0,005% (50 мг/кг) бромадиолона. По внешнему виду представляет собой цельное зерно или смесь цельного и дробленого зерна. Зерно окрашено в красный или иной яркий цвет, позволяющий человеку однозначно дифференцировать средство от доброкачественного зерна.

1.3 Выпускают препарат расфасованным по 0,1-1,0 кг в пакеты из полимерной пленки и по 1,0-10,0 кг в многослойные полимерные мешки. Пакеты из полимерной пленки упаковывают в транспортную тару - ящики из гофрированного картона или бумажные крафт-мешки. Пакеты до 5 кг включительно упаковывают в пленку термоусадочную. На этикетке каждой потребительской упаковки, кроме других сведений, в обязательном порядке делается надпись: «Осторожно – Яд»

1.4 Хранить препарат следует с особой предосторожностью (список А - в шкафу под замком), в заводской упаковке, в сухом, прохладном месте, категорически недоступном для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов и кормов, проводя регистрацию его прихода и расхода. Срок годности при соблюдении указанных условий хранения - 1 год с даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Бромадиолон относится к ядам-антикоагулянтам. Механизм действия основан на нарушении образования печенью протромбина, что снижает свертываемость крови и повреждении целостности кровеносных сосудов.

2.2 Бромадиолон, попадая в пищеварительный тракт грызунов, медленно растворяется и всасывается в кровь, поэтому отравление развивается медленно (через 3-4 дня), но от очень незначительных доз. Средняя смертельная доза для серых крыс составляет 2,0 мг/кг при разовом поступлении. Производные оксикумарина по степени воздействия на организм человека относятся к 1 классу опасности (вещества высокоопасные). Кроме того, бромадиолон обладает выраженными кумулятивными свойствами, что делает его опасным при систематическом попадании в организм.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 «Бромолон» применяют для борьбы с крысами и мышами на животноводческих фермах и других объектах ветеринарного надзора.

3.2 Приманку массой 100 г для крыс и 25 г для мышей с помощью ложки раскладывают вблизи нор и лазов грызунов, но в местах недоступных для детей и домашних животных. Соблюдая указанные выше меры предосторожности «Бромолон» можно раскладывать в пакетах, не вскрывая их. Лучше приманку размещать в специальных ящиках, оборудованных таким образом, чтобы она была доступна только грызунам. На каждые 100 м2 в зависимости от заселенности объекта грызунами размещают от 1 до 5 приманочных точек. По мере поедания приманки ее добавляют до полного прекращения поедаемости. Гибель крыс и мышей начинается на 4-5 день с момента поедания приманки.

В объектах, заселяемых грызунами периодически, допускается проводить профилактические истребительные мероприятия. Для этих целей небольшое количество приманки периодически раскладывают в местах возможного появления грызунов.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 К работе с препаратом допускаются лица не моложе 18 лет, не страдающие заболеваниями крови и прошедшие специальный инструктаж.

4.2 Все операции с «Бромолоном» проводят в спецодежде (халат или комбинезон из пылезащитной ткани, головной убор), резиновых перчатках, респираторах. Следует избегать попадания средства в глаза и рот. Во время работы со средством запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы лицо и руки моют теплой водой с мылом, рот прополаскивают водой. Беременным и кормящим женщинам работать с «Бромолоном» категорически запрещено.

4.3 Трупы грызунов собирают щипцами, совком и сжигают или закапывают в землю на глубину не менее 0,5 м, предварительно обработав яму 10% взвесью хлорной извести.

4.4 При появлении таких признаков следует немедленно вызвать врача и принять меры по удалению яда из организма (дать теплой воды и вызвать рвоту, назначить активированный уголь). При попадании «Бромолона» на кожу пораженные участки следует тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза – обильно промыть водой. В случае отравления средством в качестве противоядия назначается витамин К.

4.5 Беременным и кормящим женщинам работать с «Бромолоном» категорически запрещается.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Факс: +998 (66) 234 1134
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-13:2013

biveco®
biveco.com