«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 август 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЭНРОФЛОКСАЦИН-100 В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Энрофлоксацин-100» (раствор для инъекций).

1.2 Активнодействующим веществом в препарате является энрофлоксацин. В 1 мл препарата, содержится 100 мг энрофлоксацина.

1.3 Препарат представляет собой стерильный прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета, без видимых механических включений.

1.4 Препарат выпускают в стеклянных или полимерных флаконах по 10; 20; 50; 100; 200 и 250 мл. Хранят препарат с предосторожностью (список Б) при температуре от +5°С до +25°С в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей. Срок годности препарата 2 года от даты изготовления при указанных условиях хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к группе фторхинолонов. Механизм действия энрофлоксацина на бактериальные клетки основан на блокировании синтеза яблочной кислоты. Это вызывает морфологические изменения и гибель патогенных микроорганизмов. Препарат характеризуется быстрым всасыванием и достижением высокой концентрации в сыворотке крови.

2.2 Препарат обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных бактерий (стафилококков, стрептококков, коринебактерий, клостридий и листерий), грамотрицательных бактерий (кишечной палочки, сальмонелл, клебсиелл, протея, иерсиний, гемофильных бактерий, пастерелл, актинобациллусов, псевдомон, бордетелл, бруцелл, кампилобактерий), а также микоплазм.

2.3 Энрофлоксацин быстро всасывается из места инъекции и проникает во все органы и ткани организма. Максимальная концентрация препарата в крови достигается через 0,5-1 час после введения и сохраняется на протяжении 4-6 часов, а терапевтическая концентрация - на протяжении 24 часов.

2.4 Препарат практически не подвергается биотрансформации в организме и выделяется в неизмененном виде преимущественно с мочой и с желчью.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат назначается для профилактики и терапии следующих заболеваний у сельскохозяйственных животных и птиц:

- жвачные животные: энтериты, респираторные инфекции, колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, микоплазмоз, клостридиоз, дизентерия, лептоспироз;
- свиньи: бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта (колидиарея, колисептицемия) и бактериальные заболевания дыхательных путей;
-кролики: пастереллез, энтеротоксемия, энтериты, дизентерия, листериоз, эндометрит, заразный насморк, родентиоз и т.д.
- пушные звери (норка, лисица, песец), собаки: бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, лептоспироз.

3.2 Препарат применяется внутримышечно один раз в сутки.

Жвачные животные, свиньи: *суточная доза назначается из расчета 0,5-1 мл препарата на 20 кг массы животного (2,5 - 5 мг энрофлоксацина на 1 кг). Курс лечения – 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.*

Пушные звери (норка, лисица, песец), собаки: *суточная доза назначается из расчета 0,5 мл препарата (5 мг энрофлоксацина) на 10 кг массы животного. Курс лечения составляет 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.*

С профилактической целью назначается половина лечебной дозы в течение 3-5 дней.

3.3 Во избежание возможной болевой реакции препарат следует вводить в количестве не более 2-3 мл в одно место крупным животным и не более 1 мл - мелким животным.

3.4 Побочные действия: У свиней инъекции энрофлоксацина иногда вызывают местное раздражение. Во время лечения у телят и поросят изредка могут наблюдаться расстройства пищеварения.

Применение препаратов энрофлоксацина может вызвать изменения в суставных хрящах у собак мелких и средних пород в возрасте от 2 до 8 месяцев, а у крупных, медленно растущих пород - до 18 месяцев.

3.5 Противопоказания: Препарат нельзя применять лошадям, беременным сукам и свиноматкам, а также сукам в период лактации. Нельзя применять собакам в возрасте до 12 месяцев, а собакам крупных пород - в возрасте до 18 месяцев. Не разрешается применять энрофлоксацин-100 дойным животным.

3.6 Несовместимости: Препарат не следует применять одновременно с применением тетрациклинового ряда, макролидами, хлорамфениколом, теофилином.

3.7 Убой на мясо животных и употребление молока разрешается соответственно не ранее, чем через 14 и 4 суток после последнего применения препарата. До указанного срока мясо вынужденно убитых животных следует использовать на корм пушным зверям, а молоко - для выпойки сельскохозяйственным животным.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-45:2016

biveco®
biveco.com