«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 3 август 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЭНРОФЛОКСАЦИН-50 (ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Энрофлоксацин-50» (раствор для инъекций). Активнодействующим веществом в препарате является энрофлоксацин. В 1 мл препарата, содержится 50 мг энрофлоксацина.
1.2 Препарат представляет собой стерильный прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета, без видимых механических включений.
1.3 Препарат выпускают в стеклянных или полимерных флаконах по 10; 20; 50; 100; 200 и 250 мл.
1.4 Хранят препарат с предосторожностью (список Б) при температуре от +5°С до +25°С в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей. Срок годности препарата 3 года от даты изготовления при указанных условиях хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к группе фторхинолонов. Механизм действия энрофлоксацина на бактериальные клетки основан на блокировании синтеза яблочной кислоты. Это вызывает морфологические изменения и гибель патогенных микроорганизмов. Препарат характеризуется быстрым всасыванием и достижением высокой концентрации в сыворотке крови.
2.2 Препарат обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных бактерий (стафилококков, стрептококков, коринебактерий, клостридий и листерий), грамотрицательных бактерий (кишечной палочки, сальмонелл, клебсиелл, протея, иерсиний, гемофильных бактерий, пастерелл, актинобациллусов, псевдомон, бордетелл, бруцелл, кампилобактерий), а также микоплазм.
2.3 Энрофлоксацин быстро всасывается из места инъекции и проникает во все органы и ткани организма. Максимальная концентрация препарата в крови достигается через 0,5-1 час после введения и сохраняется на протяжении 4-6 часов, а терапевтическая концентрация - на протяжении 24 часов.
2.4 Препарат практически не подвергается биотрансформации в организме и выделяется в неизмененном виде преимущественно с мочой и с желчью.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Препарат назначается для профилактики и лечения следующих заболеваний у сельскохозяйственных животных:
- жвачные животные: энтериты, респираторные инфекции, колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, микоплазмоз, клостридиоз, дизентерия, лептоспироз;
- свиньи: бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта (колидиарея, колисептицемия) и бактериальные заболевания дыхательных путей;
- кролики: пастереллез, энтеротоксемия, энтериты, дизентерия, респираторные инфекции, листериоз, эндометрит, насморк, родентиоз и др.
- пушные звери (норки, лисицы, песцы), собаки: бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, лептоспироз;

3.2 Препарат применяется внутримышечно один раз в сутки.
Жвачным животным, свиньям и кроликам суточная доза назначается из расчета 1 мл препарата на 20 кг веса животных (2,5 мг энрофлоксацина на 1 кг). При сальмонеллезе и инфекционных заболеваниях органов дыхания - в дозе 2 мл на 20 кг веса животных (5,0 мг энрофлоксацина на 1 кг). Курс лечения составляет 3-5 дней, в зависимости от тяжести заболевания. При мастит-метрит-агалактии свиноматок курс лечения - от 1 до 2 дней.
Пушным зверям (норки, лисицы, песцы), собакам, кошкам - суточная доза назначается из расчета 1 мл препарата (5 мг энрофлоксацина) на 10 кг веса животных. Курс лечения составляет 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.
С профилактической целью назначается половина лечебной дозы в течение 3-5 дней.
3.3 Во избежание возможной болевой реакции препарат следует вводить в количестве не более 2-3 мл в одно место крупным животным и не более 1 мл - мелким животным.
3.4 Побочные действия. У свиней инъекции энрофлоксацина иногда вызывают местное раздражение. Во время лечения у телят и поросят изредка могут наблюдаться расстройства пищеварения.
Применение препаратов энрофлоксацина может вызвать изменения в суставных хрящах у собак мелких и средних пород в возрасте от 2 до 8 месяцев, а у крупных, медленно растущих пород - до 18 месяцев.
3.5 Противопоказания. Препарат нельзя применять лошадям, беременным сукам и свиноматкам, а также сукам в период лактации. Нельзя применять кошкам моложе 8 месяцев, собакам в возрасте до 12 месяцев, а собакам крупных пород - в возрасте до 18 месяцев.
Не разрешается применять энрофлоксацин-50 дойным животным.
3.6 Несовместимости. Препарат не следует применять одновременно с применением тетрациклинов, макролидных антибиотиков, левомицетина.
3.7 Убой на мясо крупного рогатого скота, овец, свиней, кроликов разрешается не ранее, чем через 14 дней, после последнего применения препарата. До указанного срока мясо вынужденно убитых животных следует использовать на корм пушным зверям или производства мясо-костной муки, а молоко - для выпойки сельскохозяйственных животных.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru.
Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-45:2013

biveco®
biveco.com