«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЭНРОВИТ-О (ОРАЛЬНЫЙ) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Энровит-О». (Enrovitum-O).
Синонимы: Энроксил, Энрофлон
1.2. Активнодействующим веществом является энрофлоксацин - антибактериальный препарат группы фторхинолонов.
1.3. «Энровит-О» содержит в 1 мл 100 мг энрофлоксацина. Представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета.
1.4. Препарат выпускают расфасованным по 100, 200, 250, 500 и 1000 мл в стеклянную или полимерную тару. Хранят препарат с предосторожностью (список Б) при температуре от +5°С до +25°С в сухом, защищенном от света месте. Срок годности при указанных условиях хранения 24 месяца.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Механизм действия энрофлоксацина заключается в его воздействии на ДНК-гиразу, которая ингибирует биосинтез яблочной кислоты у микроорганизмов.
2.2 Антибактериальный эффект препарата установлен в отношении грамположительных бактерий (стафилококков, стрептококков, коринебактерий, клостридий и листерий), грамотрицательных бактерий (кишечной палочки, сальмонелл, клебсиелл, протея, иерсиний, гемофильных бактерий, пастерелл, актинобациллусов, псевдомон, бордетелл, бруцелл, кампилобактерий), а также микоплазм.
2.3 Энрофлоксацин хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани организма. Максимальная концентрация в крови достигается через 0,5-1 час после применения препарата и сохраняется на протяжении 4-6 часов, а терапевтическая концентрация - на протяжении 24 часов.
2.4 Препарат практически не подвергается биотрансформации в организме и выделяется в неизмененном виде преимущественно с мочой и с желчью.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат назначается для профилактики и лечения следующих заболеваний у сельскохозяйственных животных и птиц:
Жвачные животные: энтериты, респираторные инфекции, колибактериоз, пас¬тереллез, сальмонеллез, микоплазмоз, клостридиоз, дизентерия, лептоспироз.
Кролики: пастереллез, энтеротоксемия, энтериты, дизентерия, респираторные инфекции, листериоз, эндометрит, заразный насморк, родентиоз и т.д.
Свиньи: бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта (колидиар¬рея, колисептицемия) и бактериальные заболевания дыхательных путей.
Птица: хронические респираторные заболевания, куриная холера и куриный тиф, сальмонеллезы, стафилококкозы, стрептококкозы, микоплазмозы, вибриозный гепатит и др.
3.2 Препарат применяется орально в смеси с водой один раз в сутки.
Жвачные животные, свиньи и кролики: *суточная доза назначается из расчета 0,5-1 мл препарата на 10 кг массы животного (2,5 - 5 мг энрофлоксацина на 1 кг). Курс лечения – 3-5 дней в за¬висимости от тяжести заболевания.*
Птица: *10 мл препарата разводится в 20 л питьевой воды и дается в течение 3 дней. В случае сальмонеллеза – до 5 дней.*
В период лечения животные и птица должны получать только воду, содержащую «Энровит-О». Раствор готовят из расчета потребности в воде на 1 сутки.
3.3 С профилактической целью назначается половина лечебной дозы в течение 3-5 дней.
3.4 Побочных эффектов не наблюдается при применении препарата в рекомендованных дозировках.
3.5 Противопоказания: Не разрешается применять препарат курам-несушкам. Не следует применять препарат совместно с хлорамфениколом, макролидными антибиотиками, тетрациклинами и нестероидными противовоспалительными средствами. Препарат не рекомендуется применять при повышенной чувствительности к фторхинолонам.
3.6 Убой на мясо крупного рогатого скота, овец, кроликов и кур разрешается не ранее, чем через 7 дней, свиней - через 5 дней, индеек - через 14 дней после последнего применения препарата. Использование молока для пищевых целей не допускается в течение 7 дней. До указанного срока мясо вынужденно убитых животных и молоко следует использовать на кормовые цели.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-46:2016

biveco®
biveco.com