«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
8 апреля 2009 г.
Протокол № 28 от 20.09.2008 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОРА ГЕНТАМИЦИНА 10%
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Раствор гентамицина 10%» (Solutio gentamycini 10%).
1.2 Активнодействующее вещество гентамицина сульфат.
1.3 Препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета, без видимых механических включений. В 1 мл препарата содержится 100 мг гентамицина.
1.4 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10, 20, 50, 100, 200 и 250 мл.
1.5 Хранят препарат по списку Б в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +5°С до +25°С.
Срок годности препарата 2 года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Гентамицин обладает широким спектром антимикробного действия, высокоэффективен в отношении штаммов стафилококков, устойчивых к пенициллинам и другим антибиотикам; некоторых штаммов стрептококков, многих грамотрицательных микроорганизмов (синегнойная палочка, клебсиелла, энтеробактер, сальмонеллы, шигеллы, протей). Антибиотик не действует на анаэробные бактерии, вирусы, простейших и грибы.
2.2 Препарат обладает высокой биодоступностью. При внутримышечном введении хорошо проникает во многие органы и ткани. Максимальная концентрация в крови достигается через 30-60 минут после введения. После однократной инъекции терапевтическая концентрация антибиотика в организме сохраняется на протяжении 8-12 часов. Выводится из организма в основном почками, создавая высокие концентрации в моче.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 «Раствор гентамицина 10%» применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам для лечения респираторных и желудочно-кишечных болезней, сепсиса, перитонита, пиелонефрита, артритов, полиартритов, дерматитов (у собак) и других заболеваний животных вызванных чувствительными к гентамицину микроорганизмами.
3.2 Препарат вводится внутримышечно в следующей дозировке:
- крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот (овцы, козы), лошади и свиньи: 0,2 мл раствора на 10 кг массы тела (по 2 мг на кг массы тела) два раза в день,
- собаки и кошки: первый день – 0,4 мл раствора на 10 кг массы тела два раза в день (4 мг гентамицина на 1 кг массы); во второй и последующие дни – 0,4 мл раствора на 10 кг массы тела один раз в день.
Новорожденным животным в течение первых дней жизни дают только половину рекомендуемой дозы. Курс лечения - 3-5 дней.
3.3 Раствор гентамицина 10% нельзя смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.
3.4 Побочные действия. У чувствительных животных возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, лихорадка). Препарат обладает ототоксическим и нефротоксическим эффектом. Длительное применение препарата может вызвать нарушение функций восьмого мозгового нерва (собаки, кошки), а также может оказать вредное действие на плод.
3.5 Противопоказания. Нарушение функции почек, одновременное применение с другими нефротоксичными препаратами, одновременное применение с миорелоксантами и некоторыми общими анестетиками, гиперчувствительность к гентамицину.
Гентамицин нельзя одновременно применять с пенициллинами, некоторыми цефалоспоринами, другими аминогликозидными антибиотиками (канамицином, неомицином, стрептомицином), хлорамфениколом, колистином, полимиксином, сульфаниламидами.
Гентамицина сульфат 10% раствор для инъекций следует с осторожностью применять при повышенной чувствительности к антибиотикам-аминогликозидам, тяжелых нарушениях функции почек, уремии, при беременности.
3.6 Убой животных на мясо разрешается не ранее 21 дня после прекращения применения препарата. Место инъекции и почки не используются для пищевых целей в течение 45 дней. Мясо животных вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей или для производства мясокостной муки.
Молоко, полученное от животных, которым применяли препарат, запрещается использовать в пищу людям в течение 3 дней после прекращения применения препарата. Такое молоко можно использовать для кормления животных.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А.Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-14:2013

biveco®
biveco.com