«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 8 апреля 2009 г.
Протокол № 28 от 20.09.2008 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОРА ГЕНТАМИЦИНА 4%
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Раствор гентамицина 4%» (Solutio gentamycini 4%).
1.2 Активнодействующее вещество - гентамицина сульфат.
1.3 Препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета, без видимых механических включений. В 1 мл препарата содержится 40 мг гентамицина.
1.4 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10, 20, 50, 100, 200 и 250 мл.
1.5 Хранят препарат по списку Б в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +5°С до +25°С.
Срок годности препарата 2 года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Гентамицин обладает широким спектром антимикробного действия, высокоэффективен в отношении штаммов стафилококков, устойчивых к пенициллинам и другим антибиотикам; некоторых штаммов стрептококков многих грамотрицательных микроорганизмов (синегнойная палочка, клебсиелла, энтеробактер, сальмонеллы, шигеллы, протей). Антибиотик не действует на анаэробные бактерии, вирусы, простейших и грибы.
2.2 Препарат обладает высокой биодоступностью. При внутримышечном введении хорошо проникает во многие органы и ткани. Максимальная концентрация в крови достигается через 30-60 минут после введения. После однократной инъекции терапевтическая концентрация антибиотика в организме сохраняется на протяжении 8-12 часов. Выводится из организма в основном почками, создавая высокие концентрации в моче.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 «Раствор гентамицина 4%» применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам для лечения респираторных и желудочно-кишечных болезней, сепсиса, перитонита, пиелонефрита, артритов, полиартритов, дерматитов (у собак) и других заболеваний животных, вызванных чувствительными к гентамицину микроорганизмами.
3.2 Препарат вводится внутримышечно в дозировке:
- крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот (овцы, козы), лошади и свиньи: 0,5-0,75 мл раствора на 10 кг массы тела (2-3 мг гентамицина на 1 кг массы тела) два раза в день,
- собаки и кошки: первый день – 1,0 мл раствора на 10 кг массы тела два раза в день (4 мг гентамицина на 1 кг массы); во второй и последующие дни – 1,0 мл раствора на 10 кг массы тела один раз в день.
Новорожденным животным в течение первых дней жизни дают только половину рекомендуемой дозы. Курс лечения 3 – 5 дней.
3.3 «Раствор гентамицина 4%» нельзя смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.
3.4 Побочные действия. У чувствительных животных возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, лихорадка). Препарат обладает ототоксическим и нефротоксическим эффектом. Длительное применение препарата может вызвать нарушение функций органов слуха и восьмого мозгового нерва (у собак и кошек), а также может оказать вредное воздействие на плод.
3.5 Противопоказания. Нарушение функции почек, гиперчувствительность к гентамицину, одновременное применение с другими нефротоксичными препаратами, миорелоксантами и некоторыми общими анестетиками, гиперчувствительность к гентамицину.
Гентамицин нельзя одновременно применять с пенициллинами, некоторыми цефалоспоринами, другими аминогликозидными антибиотиками (канамицином, неомицином, стрептомицином), хлорамфениколом, колистином, полимиксином, сульфаниламидами.
Раствор гентамицина 4% следует с осторожностью применять при повышенной чувствительности к антибиотикам-аминогликозидам и при беременности.
3.6 Убой животных на мясо разрешается не ранее 21 дня после прекращения препарата. Место инъекции и почки не используются для пищевых целей в течение 45 дней. Мясо животных вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей или производства мясокостной муки.
Молоко, полученное от животных, которым применяли препарат, запрещается использовать в пищу людям в течение 3 дней после прекращения применения препарата. Такое молоко можно использовать для кормления животных.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению

Ishlab chiqaruvchi:
O'zbekiston-Buyuk Britaniya-Rossiya Qo'shma Korxonasi
«O'ZBIOKOMBINAT» MChJ
140532, O'zbekiston Respublikasi,
Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani,
«Namuna» QFY, O'rta - Charxin mahallasi,
Tel: +998 (95) 500 8161
Faks: +998 (66) 234 1134
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-14:2013

biveco®
biveco.com