«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
РАСТВОРОВ ГЛЮКОЗЫ В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Раствор глюкозы 5%, 10%, 25% и 40%
1.2 Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость, без видимых механических включений.
1.3 Растворы глюкозы 5%, 10%, 25% и 40 % выпускают в хорошо укупоренных стеклянных флаконах по 50, 100, 200, 250, 400, 450 и 500 мл.
1.4 Хранят препарат в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от 0°С до +25°С. Допускается замораживание препарата. При замораживании желательно оттаивание в укупоренном виде.
Срок годности при соблюдении указанных условий хранения - 2 года с даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Для ветеринарных целей применяют изотонические (5%) и гипертонические (10-40%) растворы глюкозы.
2.2 При введении в вену гипертонических (10-40%) растворов глюкозы повышается осмотическое давление крови, усиливается ток жидкостей и тканей в кровь, повышаются процессы обмена веществ, улучшается антитоксическая функция печени и работа сердца, расширяются кровеносные сосуды, усиливается диурез.
Глюкоза также стимулирует синтез гормонов и ферментов в организме животных, повышает защитные силы организма.
2.3 Изотонические растворы глюкозы применяют для пополнения организма жидкостью и легкоусвояемым ценным питательным материалом. В тканях глюкоза распадается с выделением энергии, которая служит для усиления функций организма.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Глюкозу применяют при токсикоинфекциях, различных интоксикациях (отравления ртутью, мышьяком, синильной кислотой и ее солями, окисью углерода и другими веществами), при заболеваниях печени (гепатиты, циррозы), при отеке и гангрене легких, декомпенсации сердечной деятельности. Глюкозу назначают при желудочно-кишечных заболеваниях с явлениями интоксикации, гипотонии, атонии преджелудков у жвачных, ацетонемии, послеродовой гемоглобинурии, кетонурии и токсемии у коров, кетонурии у овец.
Растворы глюкозы назначают слабым и истощенным животным как энергетическое и диетическое средство.
3.2 В зависимости от тяжести заболевания препарат вводят внутрь и внутривенно 1-2 раза в день в следующих дозах:

Вид животных	Средний вес животных (кг)	Дозы в мл			
		5% Раствор	10% Раствор	25% Раствор	40% Раствор
Лошади	500	600-2400	300-1200	120-480	75-300
Крупный рогатый скот	400	600-3000	300-1500	120-600	75-350
Мелкий рогатый скот	50	200-600	100-300	40-120	25-75
Крупный рогатый скот	60	200-600	100-300	50-150	25-75
Собаки	12	40-160	20-80	10-40	5-20

Курс лечения повторяют ежедневно до исчезновения признаков заболевания.
3.3 Растворы глюкозы в рекомендованных дозах не вызывают осложнений и не оказывают побочного действия. Противопоказаний к ее применению нет.
3.4 При применении препарата животноводческая продукция используется для пищевых целей без ограничений.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-25:2013

biveco®
biveco.com