«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 8 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ИХГЛЮКОВИТА В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Ихглюковит» – комплексный препарат, в состав которого входит ихтиол, глюкоза, аскорбиновая кислота и вода.

1.2 Препарат представляет собой однородную маслянистую жидкость темно-коричневого цвета, с характерным запахом ихтиола, образующую пену при встряхивании. Допускается наличие легкого, разбивающегося при встряхивании, налета на стенках посуды.

1.3. Выпускают «Ихглюковит» расфасованным в стеклянные флаконы объемом по 50,0, 100,0, 200,0 400,0 и 450,0 мл.

1.4 Хранят препарат в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +5°С до +25°С.

Срок годности, при соблюдении указанных условий хранения – 1 год с даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 «Ихглюковит» обладает антисептическим, противопаразитарным, противовоспалительным, болеутоляющим и кровоостанавливающим действиями, стимулирует инволюцию матки после родов, способствует регенерации пораженных тканей матки и молочной железы.

2.2 В растворах ихтиол не совместим с йодистыми солями, алкалоидами и солями тяжелых металлов.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 «Ихглюковит» используют для субинволюции матки, профилактики и лечения послеродовых эндометритов, маститов у коров, телязиоза, воспаления и расстройств желудочно-кишечного тракта у молодняка сельскохозяйственных животных.

3.1.1 Для профилактики послеродовых субинволюций матки, эндометритов и маститов «Ихглюковит» вводят в дозе 10 мл на 100 кг веса отелившимся коровам двукратно внутримышечно или в межтканевое пространство тазовой полости в первые два дня после отела. Повторно препарат применяют через 48 часов в той же дозе.

3.2 С лечебной целью при эндометритах, вульвитах и маститах у коров «Ихглюковит» вводят внутримышечно или в межтканевое пространство тазовой полости в дозе 10 мл на 100 кг веса животного с интервалом 48 часов до выздоровления. При тяжелом течении заболевания показано сочетанное применение препарата с антибиотиками и другими средствами.

3.3 При введении в межтканевое пространство обрабатывают передне-верхний угол прямокишечной ямки (поочередно), справа или слева от анального отверстия по общепринятым методикам. Одномоментным толчком руки иглу вводят в межтканевое пространство тазовой полости под углом 30-45° к поверхности ямки на глубину 3-5 см в направлении мечевидного отростка грудной кости. Для введения препарата с применением шприца с поршнем требуется 30-40 секунд, самотеком - 1-1,5 минуты. Если раствор вводится самотеком, иглу продвигают на 1-3 см.

3.4 Для лечения телят с желудочно-кишечными расстройствами «Ихглюковит» применяют внутрь в дозе 1,5 (0,5) мл на 1 кг веса животного, 2-3 раза в сутки, 3-4 дня подряд или внутривенно - в дозе 0,1 мл на 1 кг веса 1 раз в сутки, 2-3 дня подряд.

3.5 Для лечения крупного рогатого скота и лошадей, больных телязиозом, препарат вводят в дозе 5-10 мл, при помощи спринцовки за третье веко и в конъюнктивальный мешок при несколько наклоненной в сторону и вниз голове животного Курс лечения - 2-3-кратное введение с интервалом - 2-3 дня.

3.6 Содержимое больной доли вымени при маститах выдаивают, кипятят и уничтожают. Молоко из здоровых долей вымени коров, подвергшихся лечению препаратом, используют без ограничений.

3.7 Побочных явлений и осложнений после применения Ихглюковита не установлено.

3.8 Животноводческую продукцию можно использовать без ограничений.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованном с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-26:2013

biveco®
biveco.com