«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 26 июля 2013 г.
Протокол № 47 от 14.11.2012 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «ИМИСАН»
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КРОВЕПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 «Имисан» (Imisan) - лекарственное средство в форме раствора для инъекций для лечения и профилактики кровепаразитарных болезней крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и собак.
1. 2 «Имисан» в качестве действующего вещества содержит в 1 мл 120 мг имидокарба дипропионата.
1. 3 «Имисан» представляет собой раствор желтого цвета.
1. 4 «Имисан» выпускают расфасованным по 10, 20, 50,100 мл во флаконы или бутылки из темного стекла соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками.
Хранят «Имисан» с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +2°С до +25°С. Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Действующее вещество - имидокарб дипропионат - активен в отношении возбудителей бабезиоза, нутталлиоза, анаплазмоза. Механизм действия основан на ингибировании метаболизма полиаминов у кровепаразитов.
2.2 После парентерального введения терапевтическая концентрация имидокарба дипропионата в крови достигается через 18-24 часа и удерживается в крови на пироплазмостатическом уровне в течение 4-6 недель. Накапливается имидокарб дипропионат, в основном, в почках и печени; выводится из организма преимущественно с мочой в неизменном виде.
2.3 «Имисан» по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 «Имисан» предназначен для лечения и профилактики кровепаразитарных болезней (бабезиоза, нутталиоза, анаплазмоза и смешанных инвазий) крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и собак.
3.2 «Имисан» вводят животным однократно внутримышечно в область шеи (крупный рогатый скот, лошади, овцы) или подкожно в область шеи (собаки) с соблюдением правил асептики и антисептики в следующих дозах:

Виды животных	Доза Имисана		
	Бабезиоз	Анаплазмоз	Смешенная инвазия
С лечебной целью			
Крупный рогатый скот	2,0 мл на 100 кг	2,5 мл на 100 кг	2,5 мл на 100 кг
Мелкий рогатый скот	0,2 на 10 кг	-	-
Лошади, ослы, мулы	2,0 мл на 100 кг	-	-
Собаки	0,25-0,5 мл на 10 кг	-	-
С профилактической целью			
Крупный рогатый скот	-	-	2,5 мл на 100 кг
Лошади, ослы, мулы	2,0 мл на 100 кг	-	-
Собаки	0,5 на 10 кг	-	-

С целью освобождения лошадей, ослов и мулов от возбудителей B.caballi и B.equi лечение проводят по следующей схеме:

Вид животных	Доза, мл/100 кг массы животных	
	B.caballi	B.equi
Лошади	По 2 мл два раза с интервалом 24 часа	По 4 мл четыре раза с интервалом 72 часа
Ослы и мулы	По 2 мл два раза с интервалом 24 часа	-

С лечебной целью «Имисан» применяют при появлении у животных клинических признаков заболевания. Больным животным предоставляют покой и дополнительно, в зависимости от физиологического состояния, назначают симптоматические средства.
С профилактической целью препарат применяют при появлении клинических признаков бабезиоза, анаплазмоза и/или смешанной инвазии у одного или двух животных из группы или в течение недели после перемещения животных в области неблагополучные по данным заболеваниям:
- крупному рогатому скоту - 1 раз в 6 недель;
- лошадям, ослам, мулам и собакам - 1 раз в 4 недели.
3.3. **Особые указания**. Для введения препарата овцам и собакам необходимо использовать шприцы с делением шкалы 0,1 мл. Собаки должны находиться под наблюдением ветеринарного врача в течение 15 минут после инъекции. Одновременно с применением препарата собакам рекомендуется применение антигистаминных средств.
Если рассчитанный объем раствора превышает 10 мл, во избежание болевого эффекта его следует вводить животному в два-три места.
Обработку животных «Имисаном» должен проводить ветеринарный врач или ветфельдшер.
Перед массовой обработкой каждую серию препарата следует испытать на небольшой группе животных (5-10 голов). При отсутствии осложнений в течение 3 суток приступают к обработке всего поголовья.
3.4. **Противопоказания.** Препарат не применяется подкожно или внутривенно (за исключением собак).
Запрещается использовать препарат в течение 4 недель после вакцинации живой вакциной против бабезиоза или анаплазмоза.
Запрещается применять одновременно с хлорорганическими и фосфорорганическими препаратами, а также с ингибиторами холинэстеразы.
3.5. **Побочное действие.** При применении «Имисана» в соответствии с рекомендованными дозами согласно настоящей инструкции побочных явлений и осложнений у животных не наблюдается. В редких случаях возможна местная реакция в виде гиперемии или болезненной припухлости в месте введения, которая исчезает через 1 -2 суток. Повторное введение может сопровождаться снижением кровяного давления, а при передозировании препарата может отмечаться брадикардия, учащение и нарушение дыхания, анорексия, тремор.
При повышенной индивидуальной чувствительности животного к препарату возможны признаки развития осложнений (угнетенное состояние, беспокойство, обильное слюнотечение, слезотечение, потоотделение, тремор мышц, частое мочеиспускание и дефекация), в этих случаях назначают подкожно 1 % раствор атропина.
При массовой гибели кровепаразитов и разрушении эритроцитов у животных возможно развитие интоксикации. В этом случае необходимо проведение интенсивной терапии, включающей внутривенные инфузии растворов электролитов и симптоматическое лечение.
3.6. Убой крупного рогатого скота и овец на мясо разрешается не ранее, чем через 45 суток после последнего применения «Имисана», при вынужденном убое ранее установленного срока мясо животных может быть использовано для производства мясокостной муки.
Молоко дойных коров разрешается использовать в пищу не ранее, чем через 7 суток после применения препарата. Ранее этого срока молоко после кипячения используют в корм животным. Молоко дойных овец, обработанных «Имисаном», нельзя использовать в пищевых целях в течение всего периода лактации.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо сразу смыть большим количеством воды.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае выявления осложнений после применения препарата, использование данной серии прекращают и об этом сообщают в Узбекскую государственную научно-контрольную лабораторию (700178, г. Ташкент, квартал Каракамыш 2/4, ул. Юнусова, 1а) и изготовителю препарата.
Одновременно в Узбекскую государственную научно-контрольную лабораторию высылают образцы серии (партии) препарата, вызвавшего у животных осложнения, с подробным описанием осложнений.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TSh 64-00483044-58:2010

biveco®
biveco.com