«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 3 август 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАЛЬЦИЯ БОРОГЛЮКОНАТА (ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР) В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Кальция бороглюконат» (Calcii borogluconas).
1.2 Кальция бороглюконат является стерильным водным раствором, содержащим кальция глюконат и вспомогательные компоненты. В 1 мл содержится 200 мг кальция глюконата.
1.2 Препарат представляет собой стерильную прозрачную, бесцветную или светло-желтую жидкость, без механических включений.
1.3 Выпускается в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200, 250, 400 и 500 мл.
1.4 Хранить препарат следует в темном прохладном месте, недоступном для детей, при температуре от +5°С до +25°С.
Срок годности 2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 «Кальция бороглюконат» по фармакологическому действию на организм животных близок к хлориду кальция. Оказывает десенсибилизирующее, антитоксическое и противовоспалительное действие; повышает в крови уровень ионизированного кальция, стимулирует обмен веществ, усиливает сокращение сердечной мышцы.
2.2 «Кальция бороглюконат» не раздражает ткани в месте инъекции, поэтому его можно применять для подкожного введения.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат применяют с лечебной и профилактической целями при следующих болезнях животных:
а) послеродовой парез, спазмофилия, эклампсия, шоковое состояние, транспортная болезнь, рахит, тетания, остеомаляция;
б) задержание последа, предродовое и послеродовое залеживание;
в) аллергические заболевания (крапивница, сывороточная болезнь);
г) отравление солями магния, токсические поражения печени.
3.2 «Кальция бороглюконат», подогретый до температуры +35°С-37°С, вводят животным внутривенно (препарат вводят медленно в течение 2-3 мин), внутримышечно или подкожно из расчета 0,5 мл на 1 кг веса животного. При внутримышечных и подкожных инъекциях дозу препарата вводят дробно в разные места.
Препарат применяется однократно, а при необходимости - повторно в тех же дозах через 24 часа.
Максимальные разовые дозы:

- крупному рогатому скоту	250-300 мл
- лошадям	150-250 мл
- овцам и козам	50-100 мл
- свиньям	30-100 мл
- собакам	5-25 мл

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1 При подкожном введении препарата возможно появление легких отеков, которые проходят через 1-2 часа. При быстром введении внутривенно может возникнуть фибрилляция желудочков сердца. В очень редких случаях может быть рвота, понос, замедление пульса, которые быстро и самостоятельно проходят.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

5.1 Противопоказан при гиперкальцемии.

6. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

6.1 Ограничений по убою животных и использованию животноводческой продукции в пищевых целях нет.

7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые флаконы с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-21:2013

biveco®
biveco.com