«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОРА
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА 10% В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 «Раствор кальция хлорида 10%».
1.2 Препарат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без механических включений.
1.3 Выпускается в стеклянных флаконах по 50, 100, 200, 250 и 450 мл.
1.4 Хранят в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +5°С до +25°С.
Срок годности при соблюдении указанных условий хранения - 3 года с даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Кальция хлорид играет важную роль в жизнедеятельности организма. Он активизирует ретикулоэндотелиальную систему и фагоцитарную функцию лейкоцитов, повышает тонус симпатической нервной системы, увеличивает выделение адреналина, ускоряет выработку многих ферментов.
2.2 Ионы кальция необходимы для сокращения скелетных мышц и мышц сердца, формирования костной ткани, свертывания крови. Ионы кальция уплотняют стенки кровеносных сосудов, тем самым проявляют противовоспалительное действие и предупреждают развитие отеков.
Кальций участвует в процессе свертывания крови, способствует превращению протромбина в тромбин.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Раствор кальция хлорида 10% применяют в качестве:
- противовоспалительного средства при пневмонии, плеврите, перитоните, токсических поражениях печени, паренхиматозном гепатите, нефрите, при лучевой болезни, токсическом отеке легких, гиперемии и отеке легких, отеке гортани, отечной болезни поросят;
- кровоостанавливающего средства при носовых, легочных, маточных и послеоперационных кровотечениях;
- десенсибилизирующего средства при аллергических заболеваниях (астма, сывороточная болезнь, кожный зуд, кровопятнистая болезнь лошадей, хроническая крапивница у лошадей и крупного рогатого скота) и аллергических осложнений после применения лекарственных средств;
- успокаивающее и нормализующее нервную систему средство при вегетативных неврозах, экзамсии у собак, ацетонемии у коров, паралитической миоглобинурии у лошадей.
Препарат применяют в акушерско-гинекологической практике, при эндометритах, метритах, для стимуляции родовой деятельности, ускорения отделения задержавшегося последа у животных, предупреждения абортов, при родильном парезе, послеродовой гематурии у коров.
Используют при гипотонии и атонии преджелудков, геморрагическом гастроэнтерите, а также при тетании молодняка животных, для повышения уровня содержания кальция в крови и снятия приступов судорог.
Также препарат назначают как противоядие при отравлении солями магния, щавелевой кислотой, растворимыми солями фтористой и щавелевой кислот, поваренной солью.
3.2 «Раствор кальция хлорида 10%» следует вводить **медленно**, внутривенно. Максимальные разовые дозы (в мл на 1 животное):

- лошадям:	100-300 мл
- крупному рогатому скоту:	150-400 мл
- мелкому рогатому скоту:	10-30 мл
- свиньям:	10-30 мл
- собакам:	5-15 мл

3.3 При хронических заболеваниях «Раствор кальция хлорида 10%» рекомендуется применять совместно с противогистаминными препаратами.
3.4 Побочные действия. В рекомендуемых дозах и при правильном способе введения препарат не вызывает у животных побочных действий и осложнений. При быстром введении может возникнуть фибрилляция желудочков сердца.
3.5 Противопоказания. Препарат нельзя вводить подкожно или внутримышечно, так как это вызывает сильное раздражение и некроз тканей.
Если при неудачном введении препарата часть его попала подкожно, необходимо для предупреждения некроза тканей ввести вокруг места инъекции большое количество изотонического раствора натрия хлорида 0,9%.
Введение раствора кальция хлорида 10% противопоказано при склонности к тромбозам, при повышенном содержании кальция в крови.
3.6 Ограничений по убою животных и использованию животноводческой продукции в пищевых целях нет.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-22:2013

biveco®
biveco.com