«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 8 апреля 2009 г.
Протокол № 28 от 20.09.2008 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА КЛОПРОСТИН (ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР) ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ОХОТЫ, ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Клопростин».
1.2 Действующим веществом препарата является клопростенол - синтетический аналог простагландина F2 альфа. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный бесцветный раствор.
1.3 Препарат выпускают во флаконах по 10, 20 и 50 мл в виде прозрачного бесцветного раствора для инъекций с содержанием в 1 мл 0,25 мг клопростенола.
1.4 Препарат хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от + 4°С до +25°С.
Срок годности при соблюдении указанных условий хранения - 18 месяцев с даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Клопростенол оказывает лютеолитическое (рассасывающее) действие на желтое тело яичников, снимает тормозящее действие прогестерона на гипоталамо-гипофизарный комплекс, что способствует росту фолликулов в яичниках, увеличению уровня эстрогенов в крови, проявлению течки, охоты и последующей овуляции созревших фолликулов. Срок от введения препарата до первых признаков течки составляет 48-72 часа.
2.2 Препарат усиливает сократительную функцию матки и проявляет биологическое действие только при наличии в яичниках активно функционирующих желтых тел.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 «Клопростин» применяют внутримышечно для синхронизации половой охоты у коров и телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистами, персистентными желтыми телами, субинволюцией матки и эндометритами; лечения и профилактики функциональных нарушений яичников у свиней, индуцирования и синхронизации опоросов; нераскрытия шейки матки у овец; прерывания беременности у животных (по показаниям).
3.2 Способ применения и дозы.
Синхронизация охоты у коров и телок. По 2 мл препарата вводят двукратно с интервалом 10 дней. Первая доза препарата вводится в любую фазу полового цикла (у коров в период с 40 по 60 день после родов). При отсутствии стадии возбуждения на 11-й день после первого введения следует ввести вторую дозу, а на 14-й день (через 72-76 часов после второго введения) проводят фронтальное искусственное осеменение (независимо от внешних признаков половой охоты) с повторным осеменением на 15-й день.
Лечение коров с лютеиновыми кистами яичников. «Клопростин» вводят однократно в лозе 4 мл. Дня повышения терапевтической эффективности препарат вводят в той же дозе одновременно с подкожной инъекцией гонадотропина СЖК в дозе 2,5-3,0 тыс. мышиных единиц (М.Е.).
При фолликулярных кистах яичников коровам подкожно однократно вводят хорионический гонадотропин в дозе 4-5 тыс. ЕД или внутримышечно Сурфагон по 5 мл в течение трех дней. Через 10-12 дней животным, не пришедшим в половую охоту, инъецируют Клопростин в дозе 2 мл.
Коровам с персистентными желтыми телами «Клопростин» вводят в дозе 2 мл, а искусственное осеменение проводят при первых признаках половой охоты. Если она не наступит, то следует повторно ввести 2 мл препарата на 11-й день после первой инъекции, с последующим осеменением через 72-76 часов согласно инструкции.
Для лечения коров, больных послеродовым эндометритом и субинволюцией матки «Клопростин» вводят двукратно, через 10-11 дней по 2 мл с одновременным назначением средств этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.
Для восстановления воспроизводительной функции у свиноматок, не проявивших охоту в течение 12 дней после отъема поросят, препарат вводят в дозе 1 мл в сочетании с одним из гонадотропных препаратов (СЖК в дозе 10 м.е. на 1 кг массы тела и др.). Для синхронизации опороса у свиноматок и профилактики послеродовых заболеваний, препарат вводят в дозе 0,7 мл на 113-114 день супоросности. Роды наступают в большинстве случаев через 24-35 часов.
Для профилактики и терапии не раскрытия шейки матки у овец суягным овцам Клопростин вводят в дозе 2 мл за 15-16 дней до предполагаемого окота. При выпадении влагалища за 3-5 дней до родов, препарат вводят в вышеуказанной дозе в сочетании с 2 мл 0,1 % масляного раствора эстрадиол-дипропионата.
Прерывание нежелательной беременности (по показаниям) достигается введением Клопростина в дозе 2 мл.
3.3 Побочные действия при применении препарата в рекомендуемых дозах не наблюдаются.
3.4 Клопростин противопоказан беременным животным, так как вызывает аборт.
3.5 Запрещается убой животных на мясо в течение 24 часов после введения препарата. Мясо животных, убитых в течение 24 часов после последнего введения препарата, используют в кормовых целях. Молоко используется без ограничений.
Убой животных на мясо запрещается в течение 48 часов после введения препарата. Мясо вынужденно убитых животных ранее установленного срока может использоваться в кормовых целях. Молоко от обработанных животных используется без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые флаконы с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-19:2013

biveco®
biveco.com