«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
МАСТИСАН-А (СУСПЕНЗИЯ) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Мастисан-А» - комплексный препарат, содержащий в своем составе бензилпенициллина натриевую соль, стрептомицина сульфат и сульфадимидин суспендированные в растительном масле. Одна доза (5 мл) препарата – содержит по 100 000 ЕД бензилпенициллина и стрептомицина и 0,35 г сульфадимидина.

1.2 Препарат представляет собой маслянистую, гомогенную суспензию, от белого до кремового цвета, расслаивающуюся при хранении.

1.3 Выпускается в стеклянных флаконах или тюбиках по 10, 20, 50, 100, 200 и 250 мл.

1.4 Хранят препарат с предосторожностью в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от 0°С до +20°С.

Срок годности при соблюдении указанных условий хранения – 18 месяцев.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 «Мастисан-А» имеет широкий спектр антибактериального действия, обусловленный входящими в его состав антимикробными компонентами, проявляющими синергизм действия. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, протей, кишечная палочка, сальмонеллы, микоплазмы и др.)

2.2 Обладает выраженным противовоспалительным и ранозаживляющим действиями. В рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего и местного раздражающею, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.

Выводится из организма с молоком.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Применяют «Мастисан-А» для лечения различных форм воспалений вымени, травматических повреждений кожи вымени и сосков.

Перед введением препарата из больной четверти вымени выдаивают молоко, а сосок дезинфицируют. Содержимое тюбика или флакона подогревают от +36°С до +39°С, тщательно встряхивают до получения равномерной взвеси и вводят в больную четверть вымени через сосковый канал с помощью катетера, который навинчивают на тюбик с препаратом или надевают на канюлю шприца. После введения препарата сосок пораженной четверти вымени слегка массируют снизу вверх.

3.2 Препарат вводят в зависимости от тяжести заболевания от 5 до 20 мл (1-4 дозы). Введение препарата при необходимости повторяют через каждые 24 ч. до полного исчезновения признаков воспаления.

3.3 Лечение травматических повреждений кожи и слизистых оболочек сосков вымени проводят путем нанесения препарата на поврежденную поверхность.

3.4 Побочные действия. В редких случаях наблюдаются аллергические реакции.

3.5 Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

3.6 Во время лечения молоко из больных четвертей выдаивают в отдельную посуду, обеззараживают и уничтожают. Молоко из остальных четвертей вымени после кипячения скармливают животным.

Молоко из четвертей вымени, подвергавшихся лечению Мастисаном-А, используют в пищу людям через 3 суток после последнего введения препарата, при условии полного исчезновения клинических признаков мастита (при обретении нормальных свойств молока по цветной реакции и пробе отстаивания).

Мясо животных, убитых в период лечения, используют для пищевых целей без ограничений, за исключением вымени, которое бракуют.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-31:2013

biveco®
biveco.com