«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «МАСТИСАН-Е»
(СУСПЕНЗИЯ) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Мастисан-Е» - комплексный препарат, содержащий в своем составе эритромицин, сульфадимезин, воск пчелиный, суспендированные в растительном масле. Одна доза (5 мл) препарата содержит 112,5 мг эритромицина и 0,4 г сульфадимезина.

1.2 «Мастисан-Е» - маслянистая, гомогенная суспензия, от белого до кремового цвета, расслаивающаяся при хранении.

1.3 Выпускают препарат в стеклянных флаконах по 100 и 200 мл или тюбиках вместимостью от 5 до 20 мл

1.4 Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от 0ºС до +20ºС

Срок годности при соблюдении указанных условий хранения - 18 месяцев.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Препарат действует на многие грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, предотвращает развитие устойчивых к антибиотикам форм микроорганизмов, способствует регенерации тканей вымени.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат назначают для лечения различных форм воспаления вымени, травматических повреждений кожи вымени и сосков.

3.2 Перед введением препарата из больной четверти вымени выдаивают молоко, а сосок дезинфицируют. Содержимое тюбика или флакона подогревают от +36°С до +39°С, тщательно встряхивают до получения равномерной взвеси и вводят в больную четверть вымени через сосковый канал с помощью катетера, который навинчивают на тюбик с препаратом или надевают на канюлю шприца. После введения сосок пораженной четверти вымени слегка массируют снизу вверх.

3.3 В зависимости от тяжести заболевания вводят от 5 до 10 мл препарата. Введение препарата при необходимости повторяют лактирующим коровам через каждые 12 часов, сухостойным коровам - через каждые 24 часа.

Курс лечения - 2-3 дня. При необходимости лечение повторяют до полного выздоровления.

3.4 Лечение травматических повреждений кожи и слизистых оболочек сосков вымени проводят путем нанесения препарата на поврежденную поверхность.

3.5 Побочные действия. В редких случаях наблюдаются аллергические реакции.

3.6 Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

3.7 Во время лечения молоко из больных четвертей выдаивают в от дельную посуду, обеззараживают и уничтожают. Молоко из остальных четвертей вымени после кипячения скармливают животным.

Молоко из четвертей вымени, подвергавшихся лечению препарата «Мастисан-Е» используют в пищу людям через 5 суток после окончания лечения, при условии полного исчезновения признаков мастита (приобретения нормальных свойств молока по цветной реакции и пробе отстаивания). Мясо животных, убитых в период лечения, используют без ограничения, за исключением вымени, которое бракуют.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-32:2013

biveco®
biveco.com