«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
8 апреля 2009 г.
Протокол № 28 от 20.09.2008 г.
НТС при ГГУ Ветеринарии

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СУСПЕНЗИЙ «МЕЦАЛЬБЕН 2,5%» И «МЕЦАЛЬБЕН 10%» ДЛЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Суспензии для орального применения «Мецальбен 2,5%» и «Мецальбен 10%».
1.2 В качестве действующего вещества 1 мл суспензии «Мецальбен 2,5%»содержит 25 мг, а 1 мл суспензии «Мецальбен 10%» содержит 100 мг альбендазола. Кроме того, в состав обоих препаратов входят вспомогательные компоненты (загустители, консерванты).
1.3 Препарат по внешнему виду представляет собой однородную жидкость от белого до светло серого цвета, расслаивающуюся при хранении.
1.4 Препарат выпускают расфасованным по 100, 200, 250, 500 и 1000 мл в полимерную тару.
1.5 Хранить его следует с предосторожностью (список Б) в заводской упаковке в темном сухом месте, не доступном для детей при температуре не выше +25°С. Срок годности - 3 года.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1Альбендазол представляет собой антигельминтик широкого спектра действия, активен в отношении зрелых и незрелых нематод, цестод, а также яиц и зрелых трематод.
2.2 Механизм действия альбендазола, входящего в состав препарата, заключается в нарушении углеводного обмена гельминтов, что приводит к их гибели и выведению из организма животного. Обладая овоцидным действием, препарат снижает зараженность пастбищ гельминтами.
2.3 Суспензии «Мецальбен 2,5%» и «Мецальбен 10%» по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам. В рекомендуемых дозах хорошо переносятся животными.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей при следующих заболеваниях:
- желудочно-кишечные нематодозы (гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз, нематодироз, остертагиоз, хабертиоз, кооперіоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, гиостронгилез, параскаридоз, аскаридоз);
- легочные нематодозы (диктиокаулез, протостронгилез, мюллериоз, неостронгилез, цистокаулез, метастронгилез);
- цестодозы (мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз);
- трематодозы (фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматоз).

3.2 Препарат дают орально, однократно, индивидуально при помощи дозировочного пистолета, других дозировочных устройств или в смеси с кормом.
Крупному рогатому скоту: *при нематодозах и дикроцелиозе суспензия «Мецальбен 2,5%» применяется в дозе 3 мл на 10 кг веса животного, суспензия «Мецальбен 10%» - 3 мл на 40 кг веса животного; при фасциолезе суспензия «Мецальбен 2,5%» применяется в дозе 4 мл на 10 кг веса животного, суспензия «Мецальбен 10%» - 4 мл на 40 кг веса животного.*
Мелкому рогатому скоту: *при нематодозах, дикроцелиозе, мониезиозе суспензию «Мецальбен 2,5%» применяют в дозе 2 мл на 10 кг; суспензию «Мецальбен 10%» - 2 мл на 40 кг веса животного; при фасциолезе, соответственно, 3 мл на 10 кг и 3 мл на 40кг веса животного.*
Лошадям: *при параскаридозе, стронгилятозе, альфортиозе, делафондиозе, аноплоцефалезе и циатостомозах применяют суспензию Мецальбен 10% в дозе 7,5 мл на 100 кг веса животного.*
Свиньям: *суспензия «Мецальбен 2,5%» применяется в дозе 2-4 мл на 10 кг, суспензия «Мецальбен 10%» - 2-4 мл на 40 кг веса животного.*
Перед применением суспензию необходимо тщательно взбалтывать.
3.3 Перед массовой дегельминтизацией каждую партию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (5-10 голов). При отсутствии осложнений в течение 3 суток приступают к обработке всего поголовья.
3.4 Побочных явлений при применении препарата в рекомендуемых дозах не отмечено.
3.5 Противопоказания. Препарат не разрешается применять при остром фасциолезе, во время случного периода, больным инфекционными болезнями и истощенным животным, а также овцам, козам и свиньям в первую половину, а коровам и кобылам - в первую треть беременности.
3.6 Убой на мясо крупного рогатого скота, лошадей и свиней допускается не ранее, чем через 14 дней, овец и коз - через 10 дней, использование молока от коров для пищевых целей - через 3 суток, от овец и коз - через 4 суток после применения препарата.
Мясо вынужденно убитых животных и молоко, полученные до истечения установленных сроков, допускается использовать для кормовых целей.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы с препаратом следует проводить с использованием спецодежды (халат, головной убор, резиновые перчатки). При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть большим количеством воды.
4.2 Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.
4.3 По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом; вымыть и просушить перчатки.
4.4 Запрещается использование тары из-под препарата для других целей.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-12:2016

biveco®
biveco.com