«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 8 апреля 2009 г.
Протокол № 28 от 20.09.2008 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ОКСИТЕТРАЦИКЛИН-100
(ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 «Окситетрациклин-100» – инъекционный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующего вещества антибиотик окситетрациклин.
1.2 Препарат представляют собой прозрачную, слегка вязкую жидкость от светло-коричневого до темно коричневого цвета, без видимых механических частиц. В 1 мл препарата содержится 100 мг окситетрациклина.
1.3 Препарат расфасовывают в стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100, 200 и 250 мл. Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +4°С до +20°С.
Срок годности при указанных условиях хранения 2 года.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Окситетрациклин является бактериостатически действующим антибиотиком. В препарате окситетрациклин находится в виде комплекса с магнием, что обуславливает его длительное (пролонгированное) действие. Окситетрациклин, входящий в состав препарата, ингибирует синтез бактериального белка, блокируя связывание аминоацил-тРНК с 30S субъединицей рибосом. Спектр действия охватывает большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, а именно: стрептококки, стафилококки, коринебактерии, клостридии, эризипелотриксы, пастереллы, фузобактерии, сальмонеллы, псевдомонады, гемофилусы, актинобактерии, шигеллы, эшерихии, хламидии, риккетсии, спирохеты и микоплазмы.
2.2 При внутримышечном применении антибиотик быстро резорбируется из места инъекции и достигает максимальных концентраций в тканях примерно через 30-50 минут после введения. Он проникает во все органы ткани животного, преодолевая плацентарный барьер. Выводится из организма преимущественно с мочой и желчью, а у лактирующих животных - также и с молоком.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 «Окситетрациклин-100» применяют при следующих заболеваниях:
- крупный рогатый скот (взрослые животные и телята): пневмония, мастит, пастереллез, плеврит, дифтерия телят, копытная гниль, кератоконьюктивит, раневые инфекции, анаплазмоз, вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.
- свиньи: пневмония, пастереллез, плеврит, мастит, атрофический ринит, рожистые воспаления, ММА синдром, гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс, раневые и послеродовые инфекции, вторичные инфекции при вирусных болезнях.
- овцы, козы: энзоотический аборт, копытная гниль, метрит, мастит, перитонит, раневые инфекции, пневмония коз.
3.2 В зависимости от выбранной лечебной схемы терапевтическая концентрация антибиотика сохраняется в течение 24 или 48 часов (пролонгированное действие).
Лечение может проводиться по одной из следующих схем:
- схема 24 часа: препарат вводят внутримышечно (медленно!) один раз в сутки из расчета 0,3-0,8 мл на 10 кг веса животного. Продолжительность лечения - 3-7 дней;
- схема 48 часов: препарат вводят внутримышечно из расчета 1,0-2,0 мл на 10 кг веса животного. Через 48 часов инъекцию повторяют.
Курс лечения составляет 3-4 введения.

Вид животных	Разовая доза в мл на 10 кг веса животного	
	Схема 24 часа	Схема 48 часов
Крупный рогатый скот	0,3-0,5	1,0
Телята	0,8	2,0
Овцы и ягнята	0,8	2,0
Свиньи	0,5	1,0
Поросята	0,8	2,0

Требуемую дозу препарата следует вводить в несколько участков тела, исходя из того, что максимальный объем вводимого препарата в одно место инъекции не должен превышать 20 мл для крупного рогатого скота, 5-10 мл - для свиней и 5 мл - для овец и коз.
3.3 Побочные действия. После введения препарата возможно развитие местной аллергической реакции в виде эритемы и зуда, которые, как правило, проходят без лечебного вмешательства.
При развитии сильной аллергической реакции необходимо внутривенное введение препаратов кальция (хлористый кальций, борглюконат кальция) или применение антигистаминных средств (димедрол).
3.4 Противопоказания. Индивидуальная сверхчувствительность к составным частям препарата.
Не рекомендуется применять одновременно с кортикостероидами и эстрогенами. В связи с выраженным снижением антибактериального эффекта окситетрациклина не применять одновременно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда.
Препарат не применяют лошадям, собакам, кошкам, а также животным других видов с почечной недостаточностью, беременным самкам, новорожденным животным.
3.5 Убой животных на мясо, которым применяли препарат, разрешается не ранее, чем через 12 суток после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, используют непосредственно для кормления животных или производства мясокостной муки.
Молоко не следует употреблять в пищу в течении 7 суток после применения препарата, но после кипячения оно может идти в корм животным.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А.Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru.
Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-18:2013

biveco®
biveco.com