«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОРА ОКСИТОЦИНА В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Раствор окситоцина».
1.2 Действующим началом препарата является окситоцин (синтетический аналог полипептидного гормона задней доли гипофиза. «Раствор окситоцина» для ветеринарии выпускается в двух вариантах содержащих в 1 мл 5 ЕД или 10 ЕД окситоцина.
1.3 Препарат представляет собой стерильную прозрачную бесцветную жидкость со специфическим запахом, без видимых механических включений.
1.4 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10; 20; 50 и 100 мл. Хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +2°С до +10°С. Срок годности 18 месяцев от даты изготовления при условии соблюдения условий хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 «Раствор окситоцина» повышает тонус и усиливает сокращения гладкой мускулатуры матки, вызывает сокращение миоэпителиальных клеток окружающих альвеолы молочной железы, стимулируя выделение молока и молочных желез у лактирующих животных.
2.2 Обладает слабыми вазопрессионноподобными, антидиуретическими свойствами.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 «Раствор окситоцина» применяют самкам сельскохозяйственных и домашних животных, при слабых потугах во время родов, задержания последа, маточном кровотечении, атонии, гипотонии и воспалении матки, маститах, а также при рефлекторной агалактии.
3.2 Препарат вводят подкожно, внутримышечно, внутривенно (медленно), при необходимости - в комбинации с новокаином эпидурально, в следующих дозах:

Виды животных	Способы введения и дозы (ЕД)		
	Подкожно или внутримышечно	Внутривенно	Эпидурально
Кобылы и коровы	30-60	20-40	15-30
Свиноматки весом до 200 кг	30	20	10-15
Козы и овцы	10-15	8-10	-
Собаки	5-10	2-7	-
Кошки	3	2	2

3.3 Побочные действия. Рвота, тахикардия, артериальная гипотензия, преждевременная отслойка плаценты. При передозировке возможна дискоординированная или чрезмерно сильная родовая деятельность.
3.4 Препарат противопоказан беременным животным, при родовспоможении, в случаях несоответствия размеров плода и таза, уродств плода, а также при неправильном его положении и членорасположении.
3.5 Продукты животноводства во время и после применения препарата используют без ограничений.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Факс: +998 (66) 234 1134
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-29:2013

biveco®
biveco.com