«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 26 июля 2013 г.
Протокол № 47 от 14.11.2012 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ПОЛИМЕР-ЙОД 10%
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ВЕТЕРИНАРНОГО НОДЗОРА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 «Полимер-йод 10%»
1.2 Препарат представляет собой вязкую темно-коричневую жидкость, хорошо смешивающуюся с водой. В 1 г "Полимер-йод 10%" содержится 100 мг активного йода, в форме йодополимерного комплекса.
1.3 Препарат расфасовывают в стеклянную тару по 10 – 250 мл и в полимерные бутылки (канистры) по 0,1 – 0,5 л.
1.4 Хранят средство с предосторожностью (список Б) в защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от 0°С до +25°С. Срок годности – 24 месяца от даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
2.1 Средство, благодаря наличию активного йода, обладает широким спектром действия в отношении неспорообразующих микробов (исключая микробактерии), вирусов, грибов. Препарат относится к группе умеренно токсических соединений. Растворы не обладают раздражающим действием, не вызывают коррозию металлов.
2.2 Средство «Полимер-йод 10%» в соответсвии с ГОСТ 12.1.007 – 76 по параметрам острой токсичности при введении в желудок относятся к 3 классу умеренно – опасных веществ и при нанесении на кожу – к 4 классу малоопасных веществ, не обладает местно – раздрадающим и сенсибилизирующим эффектом в отношении кожных покровов, вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек. Пары средства умеренно опасные в насыщающих концентрациях.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
3.1 Влажная дезинфекция. Для профилактической, а также вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции при инфекциях, относящихся к группе малоустойчивых (I группа) и устойчивых (I I группа) к основным дезинфекционным средствам, качество дезинфекции про которых контролируют по выделению кишечной палочки и стафилококка, применяют 1% раствор, при норме расхода 0,2 – 0,3 л/м^2 обрабатываемой поверхности. Экспозиция при профилактической и заключительной дезинфекции 3 часа, при текущей 1 час.
Аэрозольная дезинфекция. Для профилактической, а также вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции при инфекциях, относящихся к I и I I группам устойчивости, применяют 1,5% раствор средства из расчета 30 мл/м^3 препарата. Экспозиция при профилактической и заключительной дезинфекции 3 часа, при текущей 1 час.
3.2 При респираторных болезнях – ларинготрахеите, инфекционном бронхите, аспергиллезе птиц, инфекционном ринотрахеите, бронхите и бронхопневмонии телят, поросят и ягнят, а также при смешанных инфекциях используют 0,5%-ный раствор при норме расхода 5 – 10 мл/м^3. Общее время воздействия на животных 60 минут в день. Обработки проводят через день 3 – 5 раз.
3.3 Обработка раневых поверхностей. Для обеззараживания кожного покрова и лечения ран у животных (кастрационные, операционные, свежие и осложненные инфекциями), обработки пуповины, наружных половых органов используют 5% раствор.
3.4 Лечение некробактериоза и копытной гнили КРС, овец, коз.
Пораженное место предварительно очищают от механических загрязнений.
Неразбавленный «Полимер-йод 10%» наносят при помощи обильно смоченного марлевого тампона на очищеное место. Обработки проводят трехкратно с интервалом 1 сутки.
3.5 Побочные явления и осложнения. При соблюдении рекомендуемых доз и условий обработки побочных явлений, и осложнений от применения «Полимер-йод 10%» не выявленно.
3.6 Противопоказания. Противопоказанием для применения средства является повышенная индивидуальная чувствительность животного к йоду. В этом случаи обработку следует прекратить.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА
4.1 Рабочие растворы готовят в чистой посуде из стекла или полимерного материала путем разведения средства в дистиллированной или кипяченной водопроводной воде, исходя из расчета, приведенного в таблице. Рабочие растворы готовят в день их применения.
Приготовление рабочих растворов «Полимер-йод 10%».

Концентрация рабочего раствора по активному йоду	Количество средства "Полимер-йод 10%" (10% активного йода) и воды для приготовления рабочих растворов соответствующей концентрации							
	0,5 литра		1,0 литр		10 литров		50 литров	
	Средство, г	Вода, мл	Средство, г	Вода, мл	Средство, г	Вода, мл	Средство, г	Вода, мл
0,2%	10,0	490,0	20,0	980,0	0,2	9,80	1,0	49,0
0,5%	25,0	475,0	50,0	950,0	0,5	9,50	2,5	47,5
1,0%	50,0	450,0	100,0	900,0	1,0	9,00	5,0	45,0
1,5%	75,0	425,0	150,0	850,0	1,5	8,50	7,5	42,5
5,0%	250,0	250,0	500,0	500,0	5,0	5,00	25,5	25,0

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
5.1. Все работы со средством следует осуществлять с использованием спецодежды (халат, головной убор, резиновые перчатки). Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.
5.2. По окончанию работы руки, лицо и открытые участки тела следует вымыть теплой водой с мылом; вымыть и просушить перчатки.
5.3. При несоблюдении мер предосторожности возможно проявление раздражающего действия на органы дыхания, слизистые оболочки глаза.
5.4. При попадании средства на кожу смыть его водой.
При случайном попадании средства в глаз следует не медленно промыть их под струей воды в течении 10 – 15 мин., а затем 2% раствором пищевой соды. При проявлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости – обратится к окулисту.
При случайном попадания средства в желудок дать обильное питание (теплое молоки с боржоми или пищевой содой). При необходимости обратится к врачу.
5.5. Запрещается использовать тары из-под препарата для пищевых целей.

6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
6.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Факс: +998 (66) 234 1134
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TSh 64-00483044-61:2011

biveco®
biveco.com