«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 марта 2016 г.
Протокол № 18 от 28.11.2005 г.
НТС при ГГУ Ветеринарии

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТАБЛЕТКИ«ПРАЗИКВАНТЕЛЬ» (ДЛЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ СОБАК, КОШЕК И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Празиквантель - антигельминтный препарат, содержащий в качестве действующего вещества 50 мг празиквантеля в каждой таблетке и вспомогательные компоненты.
1.2 Празиквантель - расфасовывают по 5, 10, 25, 50, 100 шт. в полимерные пакеты и банки или в индивидуальную контурную тару (блистеры).
1.3 Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в упаковке производителя, в защищенном от света месте, предохраняя от поподания влаги при температуре от минус 8°С до + 25°С.
Срок годности препарат 3 года со дня приготовления .

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Празиквантель - антигельминтик широкого спектра действия, эфективент при применяется при эхинококкозе, дифилоботриозе, дипилидозе, гидатигерозе, мультицептозе и ориентобильхарциозе животных.
2.2. Механизм действия препарата заключается в угнетении фумаратредуктазы, нарушении проницаемости клеточных мембран и нервно-мышечной иннервации, что приводит к параличу и гибели гельминтов.
2.3 Препарат малотоксичен для теплокровных животных (ЛД50 для белых мышей при пероральном введении составляет 2650 мг/кг). В рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающими эмбрио-токсическими, тератогенными свойствами. Хорошо переносится животными.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1Празиквантель применяют однократно при эхинококкозе, дифилоботриозе, дипилидозе, гидатигерозе, мультицептозе и ориентобильхарциозе для дегельминтизации животных.
3.2 Таблетки препарата применяют животным внутрь, переорально без предварительной голодной диеты, однократно, индивидуально. Препарат задают животным непосредственно в рот (на корень языка), либо скармливают завернутыми в мясо, колбасу или в измельченном видев смеси с кормом.
3.3 Профилактическая дегельминтизация собак при эхинококкозе проводится в период с декабря по апреля через каждый 45 дней, а с мая по ноябрь через каждый 30 дней.
3.4 Дозировка: 1 таблетка на 10 кг веса собаки, кошки и других плотоядных животных, что состовляет 5мг действующего вещества празиквантела на 1 кг веса животного.
3.5 Противопоказаний по применению препарата нет. Побочных действии не отмечено. Не совместимость с другими препаратами неизвестна. Празиквантел можно комбинировать со всеми другими видами лечения.
3.6 Нельза применять препарат животным, предназначенным для получения продуктов питания.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера осложнений.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-03:2016

biveco®
biveco.com