«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОРА РИНГЕРА-ЛОККА В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Раствор Рингера-Локка» - лекарственное средство в форме раствора для инъекций, содержащее в качестве действующих веществ натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, натрия гидрокарбонат, глюкозу и воду для инъекций.
1.2 Препарат представляет собой стерильную бесцветную прозрачную жидкость, без видимых частиц, расфасованную в стеклянные флаконы по 50, 100, 200, 250, 400, 450 и 500 мл.
1.3 Хранят препарат в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от 0°С до +25°С.
Срок годности при соблюдении указанных условий хранения - 2 года с даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 «Раствор Рингера-Локка» изотоничен плазме крови животных, регулирует водно-солевое и кислотно-щелочное равновесие в организме животных.
2.2 После введения лекарственное средство быстро всасывается в месте инъекции и распределяется в органах и тканях животного.
2.3 Препарат не оказывает раздражающего действия на ткани.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 «Раствор Рингера-Локка» применяют животным при диспепсиях и других заболеваниях, сопровождающихся обезвоживанием и интоксикацией организма, при кровопотерях, для промывания ран и глаз. Используют его также для растворения различных лекарственных препаратов.
3.2 «Раствор Рингера-Локка» применяют подкожно или внутривенно в следующих дозах:

- лошадям и крупному рогатому скоту: 1000-3000 мл;
- мелким жвачным: 100-300 мл;
- телятам до одного года: 200-400 мл;
- ягнятам и поросятам: 25-100 мл;
- собакам: 10-200 мл;
- кошкам: 5-50 мл.

Дозы и сроки применения зависят от веса животных и тяжести течения болезни.
При подкожном введении дозу препарата вводят дробно в разные места.
3.3 В рекомендуемых дозах «Раствор Рингера-Локка» не вызывает у животных побочного действия и осложнений.
3.4 Применение «Раствора Рингера-Локка» не исключает использования других лекарственных средств.
3.5 Противопоказаний к применению «Раствора Рингера-Локка» не установлено.
3.6 Продукты животноводства во время и после применения «Раствора Рингера-Локка» используют для пищевых целей без ограничений.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-30:2013

biveco®
biveco.com