«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
от 3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СУЛЬФАПРИМ (ПОРОШОК, ТАБЛЕТКИ, ГРАНУЛЯТ) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Сульфаприм» - антибактериальный препарат, действующими веществами которого являются сульфамеразин и триметоприм.

1.2 «Сульфаприм» выпускается в форме порошка, таблеток и гранулят. По внешнему виду представляет собой: однородный мелкокристаллический порошок от белого до кремового цвета или гранулы различной формы от белого до кремового цвета или таблетки круглой формы белого цвета, или белого цвета с желтым оттенком.

Один грамм препарата в форме порошка или гранулята содержит 0,12 г активного вещества (0,1 г сульфамеразина и 0,02 г триметоприма). Каждая таблетка содержит 0.48 г активного вещества (0,4 г сульфамеразина и 0,08 и триметоприма).

1.3 Препарат расфасовывают: порошок и гранулят - в двойные пакеты из полиэтиленовой пленки или в полимерные пакеты по 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0 кг; таблетки - в непрозрачные полимерные банки по 50, 100, 250, 500, 1000 штук или в блистеры из комбинированных материалов - по 10-50 шт.

1.4 Препарат хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от 0°С +25°С.

Срок годности при соблюдении указанных условий хранения - 2 года с даты изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Входящие в состав препарата компоненты, обладают синергидным действием, обусловливают его высокую антимикробную активность. Препарат подавляет развитие многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, пастерелл, эшерихий, но не активен в отношении грибов и вирусов.

Препарат нарушает у микроорганизмов биосинтез фолиевой кислоты.

2.2 При оральном применении препарат легко всасывается из желудочно-кишечного тракта и, проникая в органы и ткани, оказывает бактерицидное действие. Максимальная концентрация в крови отмечается через 2-4 часа после введения. Терапевтическая концентрация удерживается в крови в течение 12 часов. Выделяется препарат, главным образом, с мочой.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 «Сульфаприм» применяют молодняку сельскохозяйственных животных при пневмониях, катаральной бронхопневмонии, бронхите, ларингите, ангине, сепсисе, некробактериозе овец и северных оленей, диспепсии, гастроэнтеритах, инфекции мочевых путей, сальмонеллезе, пастереллезе, респираторном микоплазмозе, эймериозе птицы и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

3.2 Препарат назначают внутрь в течение 4-6 дней 2 раза в сутки из расчета 5 г порошка или гранулят на 20 кг веса животного или 1 таблетку на 15 кг веса животного, что составляет 30 мг активной субстанции на 1 кг. Таблетки задают с кормом, питьевой водой или непосредственно животному на корень языка.

В процессе лечения животным обеспечивают свободный доступ к воде.

Птице назначают из расчета 1,0 г на 5 кг корма 2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 3-5 дней.

«Сульфаприм» можно применять в сочетании с антибиотиками. В этих случаях антимикробный спектр и терапевтические свойства препаратов существенно увеличиваются.

3.3 Побочные действия при рекомендуемых дозировках, как правило, не наблюдаются. При повышенной индивидуальной чувствительности животных к сульфаниламидам возможны потеря аппетита, понос и рвота. В этих случаях применение препарата прекращают.

3.4 Применение сульфаприма противопоказано при заболеваниях органов кроветворения, остром гепатите, нефрите и повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Запрещается применять препарат дойным животным.

3.5 Убой животных на мясо разрешается через 7, а птицы 12 дней после последнего применения препарата. Мясо вынужденно убитых животных до истечения указанного срока используют для кормления плотоядных животных или производства кормовой мясокостной муки. Молоко в пищу людям следует использовать не ранее чем через четверо суток после последнего применения препарата. До истечения указанного срока молоко скармливают животным после кипячения.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-38:2013

biveco®
biveco.com