«О Д О Б Р Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
9 августа 2016 г.
Протокол № 72 от 04.08.2016 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «СУПЕРКИЛЛЕР-Е» (25% КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ) В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Препарат «Суперкиллер-Е» (25% воднодиспергируемый концентрат эмульсии) - пиретроидный инсекто-акарицидный препарат, действующим веществом которого является циперметрин - а-циано-3-феноксибензил-цис транс-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил) циклопропанкарбоксилат. Эмпирическая формула: C22H19O3NCl2. По внешнему виду - маслянистая жидкость от белого до желтовато-коричневатого цвета со слабым специфическим запахом.
1.2 Препарат выпускается расфасованным:
- по 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 л в полимерные бутылки;
- по 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10,0, 15,0, 20,0; 25,0 л в канистры стальные или полимерные;
- по 50,0; 100,0; 200,0 л в бочки металлические или полимерные.

1.3 Препарат следует хранить с предосторожностью (список Б) в заводской упаковке в складских помещениях, отдельно от пищевых продуктов и кормов, вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов при температуре не выше +25°С.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения 3 года со дня изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Действие препарата заключается в том, что компоненты его взаимодействуют с нервными мембранами насекомых, блокируя ионные каналы, тем самым, препятствуя нормальной проводимости нервных импульсов. Жировая основа препарата способствует быстрому проникновению действующего вещества, что ведет к гибели паразитов.
2.2 Циперметрин относится к умеренно токсичным соединениям для теплокровных животных и в рекомендуемых дозах при наружном применении не вызывает интоксикации.
2.3 Препарат стабилен при хранении, хорошо эмульгируется с водой, образуя эмульсию светло-молочного цвета. Активен в отношении яиц, личинок и взрослых особей пастбищных и чесоточных клещей, вшей, блох, мух и комаров.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Животных обрабатывают путем опрыскивания водными растворами (рабочими эмульсиями) препарата «Суперкиллер-Е», для чего используют различные опрыскивающие установки - ДУК, ВДМ, ОДН и др. механизмы, обеспечивающие давление жидкости 2,5-3 атмосфер, а также стационарные душевые камеры. Температура рабочей эмульсии должна быть в пределах 15-25°С, а воздуха при обработке животных - не ниже 10°С.
3.2 ***Для борьбы с пастбищными клещами крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, овец, коз и свиней готовят рабочую эмульсию из расчета 12 мл препарата «Суперкиллер-Е» на 18 л воды.*** Опрыскивают животных до полного смачивания кожно-волосяного покрова. Повторные обработки животных проводят с интервалом 3 недели до конца сезона нападения клещей.
3.3 ***Для борьбы с чесоточными клещами крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов и свиней опрыскивают рабочей эмульсией в разведении 60 мл препарата на 400 л воды.***
3.4 ***Овец и коз для профилактики чесотки*** и в случае подозрения заболевания опрыскивают или купают в течение от 30 секунд до 1 минуты в рабочей эмульсии в разведении ***60 мл препарата на 830 л воды. Ванну дополняют рабочей эмульсией в разведении 60 мл препарата на 622 л воды.***
В ***тяжелых случаях поражения чесоточными клещами животных*** опрыскивают или купают в рабочей эмульсии, приготовленной из расчета ***60 мл препарата на 500 л воды***, погружая все тело животного в рабочую эмульсию от 30 секунд до 1 минуты. При этом ванну дополняют рабочей эмульсией в разведении ***60 мл препарата на 375 л воды***.
При необходимости обработку повторяют через 10 дней.
3.5 ***Для уничтожения мух 40 мл препарата разбавляют в 10 л воды, для уничтожения комаров - 40 мл препарата разводят в 20 л воды и выборочно опрыскивают места их скопления.***
3.6 ***Для уничтожения клещей в животноводческих помещениях их следует обрабатывать рабочей эмульсией в разведения 40 мл препарата на 10 л воды.*** Помещение опрыскивают из расчета 200 мл рабочей эмульсии на 1 м2 обрабатываемой поверхности. Через 2,5-3 часа после обработки проводят дезактивацию кормушек и поилок 3% раствором кальцинированной соды.
Животных размещают в обработанные помещения не ранее 3-4 часов после проведения дезакаризации.
При дезакаризации помещений, кроме клещей, погибают вши, блохи, мухи и комары, а также тараканы, пауки и другие насекомые.
3.7 В случаях отравлений животных (угнетенное состояние, слюнотечение, частое мочеиспускание, симптомы нервных расстройств) подкожно вводят следующие антидоты: 1% атропин в дозе 1 мл на 100 кг живого веса. Если явления интоксикации не проходят атропин вводят повторно в той же дозе.
3.8 Убой на мясо животных разрешается через 10 суток, использование молока в пищевых целях - через 2 суток после обработки.
Молоко и мясо животных, содержащихся в помещениях, обработанных рабочей эмульсией препарата допускается использовать в пищу без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 Работу с препаратом необходимо проводить в спецодежде, резиновых перчатках, сапогах. В обязательном порядке следует применять противогазы с коробками марки «А» или респираторы Ф-62М, Астра-2, Лепесток-5, Лепесток-40, Лепесток-200.
4.2 Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу.
4.3 По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом и прополоскать ротовую полость и нос. Освободившуюся тару сжечь или закопать.
4.4 В случае появления у работающих с препаратом признаков отравления (головокружение, тошнота, повышенная саливация, слезотечение) следует прекратить работу, вывести пострадавших из помещения, снять спецодежду и защитные приспособления, вымыть лицо и руки водой с мылом и обратиться к медицинской помощи.
При попадании препарата в глаза их следует промыть водой или 2% раствором пищевой соды. При появлении раздражения слизистой оболочки глаз закапывают 30% альбуцид, при болезненности - 2% раствором новокаина.
Специфические антидоты: атропин сульфат, диэтиксим, 2-ПАМ.
4.5 Препарат токсичен для рыб, пчёл и других полевых насекомых. Препарат следует хранить в местах недоступных для детей.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае выявления осложнений после применения препарата, использование данной серии прекращают и об этом сообщают в Узбекскую государственную научно-контрольную лабораторию по адресу 100178, г. Ташкент, ул. Каракамышская, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30-47. E-mail: vpinl@qsxv.uz. Одновременно в адрес лаборатории высылают 2-3 не вскрытые упаковки с препаратом и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-05:2016

biveco®
biveco.com