«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 август 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ВИРКОЦИД В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Виркоцид» (Virkocid) - представляет собой крупнозернистый порошок или смесь порошка и гранулята от розового до серо-розового цвета, в состав которого входят перекисное соединение калия и вспомогательные вещества (поверхностно-активные вещества (ПАВ), органические кислоты и наполнитель). Дополнительно в препарат может быть введена лимонная отдушка. **Синонимы: виркон, экосепт.**

1.2 По внешнему виду представляет собой крупнозернистый порошок или смесь порошка и гранулят от розового до серо-розового цвета.

1.3 «Виркоцид» выпускают расфасованным в полимерные пакеты по 50, 100, 250, 500 и 1000 г или в полимерные емкости по 250, 500, 1000, 2000 и 3000 г.

1.4 Хранить препарат следует в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +1°С до +25°С. Срок годности при соблюдении указанных условий хранения в невскрытой упаковке – 1,5 года со дня изготовления.

«Виркоцид» не горюч, взрывобезопасен.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Входящие в состав препарата пероксиды, ПАВы и органические кислоты обеспечивают сильное окислительное действие на клетки большинства патогенных бактерий, грибов и вирусов, приводящее к их гибели.

«Виркоцид» эффективен при трихофитии, бруцеллезе, роже, заболеваниях, вызываемых стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой, пастереллами, сальмонеллами, гемофилами.

«Виркоцид» оказывает обеззараживающее действие на вирусы инфекционное ринотрахеита, диареи, респираторно-синтициальной инфекции, классический чумы свиней, репродуктивно-респираторного синдрома, корона- и энтеровирусы, вирусы ньюкаслской болезни и Гамборо, инфекционного бронхита, инфекционного гепатита, алеутской болезни норок и других заболеваний пушных зверей, а также при всех инфекционных заболеваниях, возбудители которых чувствительны к действию окислителей, исключая микобактерии и спорообразующие бактерии.

2.2 «Виркоцид», согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к III классу опасности (умеренно опасные вещества). Рабочие растворы препарата по токсичности относятся к IV классу опасности (вещества малоопасные).

2.3 Препарат не вызывает коррозии металлов, не обесцвечивает ткани, не раздражает дыхательные пути, экологически безопасен – после применения полностью распадается.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 «Виркоцид» применяют:

- для профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции методом орошения поверхностей свободных от животных и птиц помещений, оборудования, пасек, виварием, лабораторий, транспортных средств, инкубационных яиц;
- для проведения локальной дезинфекции стойл, кормушек, поилок, стен, полов и т.д. в помещения в присутствии животных и птиц при условии проветривания помещения в процессе проведения работы;
- для дезинфекции спецодежды, инвентаря и посуды;
- для профилактической дезинфекции воздуха аэрозольным методом в присутствии животных и птиц.

3.1.1 Для дезинфекции поверхностей «Виркоцид» применяют при температуре воздуха выше 0°С, в концентрации 1,0% при температуре рабочего раствора - от +5°С до +25°С.

При дезинфекции решетчатых поверхностей, сеток, поверхностей из слабо адсорбирующих материалов расход рабочего раствора составляет 0.75 литра на 1 м^3, при обработке полов, кормушек и стен – 1 л 1 м^3.

3.1.2 Контаминированную спецодежду, инвентарь, посуду, обеззараживают замачиванием на 24 часа в 0,5% растворе или на 3 часа в 0,7% растворе Виркоцида.

3.1.3 Контаминированные (исключая микобактерии и спорообразующие бактерии) микроорганизмами яйца, обеззараживают методом погружения на 15 минут в 0,35% раствор препарата «Виркоцид».

3.1.4 Локальную дезинфекцию Виркоцидом проводят при бактериальных (исключая туберкулез и спорообразующие бактерии, грибковых и вирусных инфекциях методом орошения 1%-ным раствором при норме расхода 1 литр на 1 м^3 и направленными аэрозолями при концентрации раствора 4% из расчета 150 мл на 1 м^3.

3.1.5 Профилактическую дезинфекцию воздуха в присутствии животных и птиц проводят методом объемного аэрозоля 1-2%-ными растворами из расчета 10 мл на 1 м^3.

3.1.6 При приготовлении рабочих концентраций растворов порошок Виркоцида принимается за 100%. Рабочие растворы препарата готовят непосредственно перед дезинфекцией, заливая в емкости водопроводную воду и добавляя при перемешивании необходимое количество препарата.

Не допускается подогревание раствора или применение горячей воды.

3.1.7 Раствор готовят в любых пригодных емкостях, в том числе непосредственно в ДУКе, ЛСД и др.

3.1.8 Перед проведением дезинфекции определяют обрабатываемую площадь (S). Необходимый объем в литрах рабочего раствора (В) вычисляют для сетчатых и слабо адсорбирующих поверхностей по формуле:

$B = S \times 0,75$

Для полов, кормушек, стен:

$B = S \times 1.$

3.1.9 Рабочий раствор наносят на объекты орошением из установок типа ДУК, ЛСД и т.п. и выдерживают минимальную экспозицию - 1 ч.

Для проведения направленной аэрозольной дезинфекции применяют насадки (ТАН, ПВАН и др.), объемная дезинфекция осуществляется аэрозольными генераторами холодного тумана.

Перед дезинфекцией поверхности подвергают механической очистке, согласно действующей Инструкции по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства. Для повышения эффективности дезинфекции целесообразно при механической очистке проводить увлажнение и мойку поверхностей с применением моющих средств согласно наставлениям по их применению.

В виду низкой токсичности продуктов распада рабочего раствора Виркоцида, последующую мойку обработанных поверхностей не проводят.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 К работе не допускаются лица моложе 18 лет, а также имеющие противопоказания для работы с дезсредствами.

4.2 При работе со средством и его рабочими растворами необходимо соблюдать общие правила безопасности, использовать спецодежду с комплектом средств индивидуальной защиты (комбинезон, прорезиненные или пластиковые нарукавники, фартук прорезиненный, перчатки резиновые, сапоги резиновые, очки защитные, респиратор или противогаз марок А, В, М или БКФ).

4.3 При попадании средства в глаза необходимо промыть их струей воды в течение 10-15 минут и закапать 30% раствор сульфацида натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-40:2013

biveco®
biveco.com