«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
3 августа 2009 г.
Протокол № 31 от 24.07.2009 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
«СЕЛЕН+ВИТАМИН Е» (ЖИДКОСТЬ) В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Селен + Витамин Е» (Selenium +Vitaminum E).
1.2 Препарат содержит витамин Е (альфа-токоферол ацетат) и селен в форме натрия селенита. В 1 мл препарата содержится 50 мг витамина Е и 1 мг селена.
1.3 «Селен + Витамин Е» представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость (допускается опалесценция) со слабым специфическим запахом.
1.4 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10, 20, 50, 100, 200 и 250 мл. Хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности препарата 2 года при соблюдении условий хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 «Селен + Витамин Е»восполняет недостаточность витамина Е и селена в организме животных.
Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D3. Также оказывает влияние на состояние иммунитета, общую сопротивляемость организма, репродуктивную функцию.
Селен в значительной степени содействует эффективности витамина Е, также играет роль в окислительно-восстановительных процессах.
2.2 Введение препарата в организм приводит к быстрому возрастанию уровня витамина Е и селена в крови и других тканях.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат применяют с целью профилактики заболеваний, обусловленных недостаточностью селена и витамина Е, лечения животных больных беломышечной болезнью, а также в качестве средства патогенетической терапии, улучшения обмена веществ, повышения воспроизводительной способности самок, естественной резистентности организма молодняка и устойчивости его к неблагоприятным факторам окружающей среды, лечения токсической дистрофии печени у животных, а также при задержке роста и недостаточных привесах, при энцефаломаляции и экссудативном диатезе птицы.
3.2 Препарат вводится всем видам животных внутримышечно или подкожно (лошадям только внутримышечно) с профилактической целью 1 раз в 2-4 месяца в дозе:
- взрослым животным (крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади): 1 мл на 50 кг веса животных;
- молодняку сельскохозяйственных животных: 0,2 мл на 10 кг веса животных;
- собакам, кошкам, пушным зверям: 0,04 мл на 1 кг веса животных.

Домашней птице препарат применяется в дозе 130 мл на 1000-2000 литров воды. С профилактической целью препарат дают цыплятам, начиная с суточного возраста. 1 раз в 2-3 недели, взрослой птице - 1 раз в месяц; с лечебной целью - 2-3 раза с интервалом 1 -2 недели.
С лечебной целью доза препарата может быть увеличена не более чем в 1,5 раза. При необходимости препарат вводят повторно через 7-10 дней.
3.3 Особые указания. При передозировке препарата могут возникнуть токсические явления, поэтому доза одному животному не должна превышать: для лошадей 20 мл, для коров 15 мл, для овец, коз и свиней - 5 мл. Поросятам препарат применяют не ранее 8-дневного возраста.
Перед массовыми обработками необходимо поставить пробу на переносимость на 3-4 животных. Срок наблюдения - 1 сутки.
3.4 Противопоказания к применению. Применение препарата противопоказано при повышенной индивидуальной чувствительности животных к селену либо при обработке животных в течение последних 10 дней другими препаратами, содержащими селен.
3.5 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает у животных осложнений и побочных эффектов. В случае анафилактической реакции следует немедленно ввести адреналин. При отравлении животных вследствие передозировки для лечения применяют арсаниловую кислоту или натриевую соль арсаниловой кислоты (атоксил) из расчета 1,5-2 мг на 1 кг веса животных. Также используется унитиол, натрия тиосульфат, метионин.
3.6 Мясо, молоко и яйца, полученные от животных и птиц, подвергавшихся лечебно-профилактическим обработкам препаратом, можно использовать для пищевых целей без ограничений.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

4.1 В случае несоответствия препарата требованиям настоящего Наставления, применение его прекращают, сообщают об этом Узбекской государственной научно-контрольной лаборатории ветеринарных препаратов по адресу: 700178, г Ташкент, ул. А. Юнусова, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30- 47. E-mail: uzgnkl@rambler.ru. Одновременно в адрес лаборатории высылают не вскрытые упаковки с препаратом в количестве, предварительно согласованным с лабораторией, и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-39:2013

biveco®
biveco.com