«О Д О Б Р Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
9 августа 2016 г.
Протокол № 72 от 04.08.2016 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «МЕЦАЛЬБЕН-700» (ТАБЛЕТКИ) В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Препарат «Мецальбен-700» в своем составе в качестве активно действующего вещества содержит альбендазол (0,7 г в таблетке), а также вспомогательные компоненты.
1.2 Препарат по внешнему виду представляет собой таблетки правильной округлой формы от свело-серого до серого с кремовым оттенком цвета.
1.3 Препарат «Мецальбен-700» выпускаются расфасованными в полимерную тару по 10; 25 – 500 штук или 5 – 20 штук в индивидуальную контурную тару (блистеры).
1.4 Хранить препарат следует в заводской упаковке, в темном и сухом месте, недоступном для детей, при температуре не выше +25°С. Срок годности препарата 3 года.

2 ФАРМОКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Альбендазол представляет собой антигельминтик широкого спектра действия, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод и цестод, а также половозрелых трематод.
2.2 Механизм действия альбендазола, входящего в состав препарата, заключается в нарушении углеводного обмена гельминтов, что приводит к их гибели и выведению из организма животного. При пероральном введении препарата альбендазол быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы и ткани; из организма выделяется в основном с мочой и фекалиями. Препарат обладая овоцидным действием, снижает зараженность гельминтами пастбищ.
2.3 Препарат по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам. В рекомендуемых дозах животных отрицательные действия не наблюдаются.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Таблетки «Мецальбен-700» применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей при следующих заболеваниях:
- желудочно-кишечные нематодозы (гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз, нематодироз, остертагиоз, хабертиоз, кооперіоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, гиостронгилез, параскаридоз, аскаридоз);
- легочные нематодозы (диктиокаулез, протостронгилез, мюллериоз, неостронгилез, цистокаулез, метастронгилез);
- цестодозы (мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз);
- трематодозы (фасциолез, дикроцелиоз, парамфистомоз).

3.2 Таблетки задают животным принудительно на корень языка, однократно в следующих дозах:
- крупному рогатому скоту – 1 таблетка на 120 кг, при фасциолезе, дикроцелиозе, парамфистоматозе и остертагиозе – 1 таблетка на 80 кг веса животного;
- овцам и козам – 0,5 (половина) таблетки на 60 кг; при фасциолезе, дикроцелиозе и протостронгилоидозе – 0,5 (половина) таблетки на 50 кг массы животного;
- свиньям – 1 таблетка на 60 кг;
- лошадям, ослам – 1 таблетка на 70-90 кг живого веса.
Специальной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.
3.3 Особые указания. Перед массовой дегельминтизацией каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (5-10 голов). При отсутствии осложнений в течение 3 суток обрабатывают все поголовья.
3.4 Побочные явления. При применении таблеток «Мецальбен-700» в рекомендуемых дозах побочных явлений не наблюдается.
3.5 Противопоказания. Препарат не разрешается применять при остром фасциолезе, во время случного периода, больным инфекционными болезнями и истощенным животным. Также не разрешается применять препарат овцам, козам и свиньям в первую половину, а коровам и кобылам – в первую треть беременности.
3.6 Мясо крупного рогатого скота и овец можно использовать для пищевых целей, соответственно, через 14 и 10 дней, а молоко, соответственно, через 3 и 4 дня после применения препарата.
При вынужденном убое ранее установленных сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям или при производстве мясокостной муки.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы с препаратом следует проводить с использованием спецодежды (халат, головной убор, резиновые перчатки). При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть большим количеством воды.
4.2 Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.
4.3 После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом; вымыть и просушить перчатки.
4.4 Запрещается использование тары из-под препарата для других целей.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае выявления осложнений после применения препарата, использование данной серии прекращают и об этом сообщают в Узбекскую государственную научно-контрольную лабораторию по адресу 100178, г. Ташкент, ул. Кара-камышская, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30-47. E-mail: vpinl@qsxv.uz. Одновременно в адрес лаборатории высылают 2-3 не вскрытые упаковки с препаратом и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-11:2016

biveco®
biveco.com