«О Д О Б Р Е Н О»
Главным Государственным
Управлением Ветеринарии
МСВХ Республики Узбекистан
9 августа 2016 г.
Протокол № 72 от 04.08.2016 г.
НТС при ГГУВ МСВХ РУз

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА «МОНЕЗОЛ» В ВЕТЕРИНАРИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Препарат «Монезол» (Monezol) суспензия для орального применения, в качестве действующих веществ 1 мл содержится 2,0 мг ивермектина и 40,0 мг празиквантела, атак-же вспомогательные компоненты (загустители, консерванты, стабилизаторы).
1.2 Препарат по внешнему виду представляет собой однородную суспензию белого цвета с серым или желтоватым оттенком. При хранении допускается расслаивание суспензии, исчезающее при взбалтывании.
1.3 Препарат выпускают расфасованным по 100, 200, 250, 500 и 1000 мл в полимерную тару.
1.4 Хранить его следует с предосторожностью (список Б) в заводской упаковке в сухом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от +5°С до +20°С. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года от даты изготовления. Монезол следует хранить в местах, недоступных для детей.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Монезол обладает широким спектром противопаразитарного действия на имагинальные и личиночные фазы развития паразитирующих у сельскохозяйственных животных нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также цестод и личинок овечьего овода (Oestrus ovis).
2.2 Механизм действия ивермектина, входящего в состав лекарственного средства, заключается в его воздействии на проникновение ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток нематод и личинок оводов. Основной мишенью являются глутамат чувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение процесса проникновения ионов хлора нарушает проведение импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита.
2.3 Механизм действия празиквантела основан на деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции цестод, что вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель гельминтов.
2.4 Максимальная концентрация празиквантела и ивермектина в плазме крови животных отмечается через 4-6 часов после перорального введения препарата. Выводится монезол из организма в основном с фекалиями и мочой, у лактирующих животных также с молоком.
2.5 Монезол по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Токсичен для рыб и пчел.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Монезол назначают крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям и сельскохозяйственным птицам с лечебной целью однократно перорально при цестодозах, нематодозах желудочно-кишечного тракта и легких, а также овцам при эстрозе.
3.2 ***Крупному и мелкому рогатому скоту,*** монезол применяют при нематодозах желудочно-кишечного тракта (гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз, нематодироз, хабертиоз, кооперноз, остертагиоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, трихоцефалез, неоаскариоз) ***– 1 мл на 20 кг ,*** при нематодозах легких (диктиокаулез, мюллериоз, цистокаулез, протостронгилез) и цестодозах ж.к.т. (мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз) ***- 1 мл на 10 кг массы животного.***
3.3 ***Овцам*** при эстрозе индивидуально дозу лекарственного средства увеличивают ***до 1 мл на 10 кг массы животного.***
3.4 ***Свиньям*** монезол применяют при нематодозах (аскаридоз, эзофагостомозы, метастронгилезы, трихоцефалез, стронгилоидоз) индивидуально в дозе ***0,7 мл на 10 кг массы животного.***
3.5 ***Цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур до 16 -недельного возраста, гусям и уткам*** монезол применяют при нематодозах (гангулетеракидоз, аскаридиоз, гетеракидоз) и цестодозах (дрепанидотениоз, гименолептидозы, райетинозы) индивидуально или групповым способом с кормом в утреннее кормление два дня подряд ***в дозе 0,2 мл/кг массы птицы.***
Перед массовыми обработками каждую серию монезола испытывают на небольшой группе животных (5-7 голов) разного возраста и массы. При отсутствии в течение 3 дней осложнений приступают к обработке всего поголовья.
3.6 **Побочные явления.** Побочных явлений и осложнений у животных при применении монезола в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.
Убой на мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней разрешается не ранее, чем через 28 суток, кур – не ранее, чем через 15 суток после применения, а молоко, соответственно, через 3 и 4 дня после применения препарата.
При вынужденном убое ранее установленных сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям или при производстве мясокостной муки.
3.7 **Противопоказания.** Запрещается применение монезола курам -несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, яйца которых используют в пищевых целях, дойным, а также беременным коровам, овцам и козам, менее чем за 28 дней до отела (окота), ввиду накопления ивермектина в яйцах и выделения с молоком, истощенным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.
3.8 **Особые указания.** Перед массовой дегельминтизацией каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (5-10 голов). При отсутствии осложнений в течение 3 суток приступают к обработке всего поголовья.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе с Монезолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.
Пустую тару из-под лекарственного средства запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. По истечению срока годности монезол не должен применяться.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае выявления осложнений после применения препарата, использование данной серии прекращают и об этом сообщают в Узбекскую государственную научно-контрольную лабораторию по адресу 100178, г. Ташкент, ул. Кара-камышская, 1а. Тел./факс: 228-76-14, 229-30-47. E-mail: vpinl@qsxv.uz. Одновременно в адрес лаборатории высылают 2-3 не вскрытые упаковки с препаратом и подробное описание характера несоответствия препарата Наставлению.

Производитель:
Узбекско-Великобританско-Российское Совместное Предприятие
ООО «УЗБИОКОМБИНАТ»
140532, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастдаргомский район,
«Намуна» КФИ, Урта-Чархин махалля
Тел: +998 (95) 500 8161
Отдел продаж: +998 (95) 509 0500
www.biokombinat.uz
info@biokombinat.uz

TS 00483044-52:2016

biveco®
biveco.com